

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:

Ruhsat Tarih ve Numarası: 31.01.2022 / 12227

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Şeker pancarı	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	400 ml/da	90 gün
	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	Çıkış öncesi	
Sirken (<i>Chenopodium album</i>)			
	Yatık sirken (<i>Chenopodium vulvaria</i>)	400 ml/da	90 gün
Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)			
	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)	Çıkış sonrası	
Yatık sirken (<i>Chenopodium vulvaria</i>)			
	Duvar kazayağı (<i>Chenopodium murale</i>)		
Yabani marul (<i>Lactuca serriola</i>)			

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı ve uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın istatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

STILLO® 700 SC tek yıllık geniş yapraklı yabancı otlara karşı, çıkış öncesi ve çıkış sonrası kullanılan sistemik bir herbisittir. Yabancı otların kökleri ve yaprakları vasıtasıyla bünyelerine girer. Ksillem aracılığıyla akropetal olarak taşınır. **STILLO® 700 SC**'nin etkili olabilmesi için toprak nemi oldukça önemlidir. Uygulamalar eğer kuru toprağa yapılırsa **STILLO® 700 SC**'nin etkisi, meydana gelecek olan yağışlardan sonra görülmeye başlar.

Çıkış öncesi uygulama: **STILLO® 700 SC** uygulaması şeker pancarı ekiminden sonra, toprağın nemli, düzgün sürülmüş, keseksiz, aşırı bitki kalıntısı olmayan ve yabancı otların çıkışının başlamadığı yerlerde yapılmalıdır. Yabancı otların çimlenmesinden önce uygulama yapılan alanda, 5 gün içerisinde en az 10 mm yağmur düşmesi veya yağmurlama sulama sistemi ile sulanması **STILLO® 700 SC**'nin toprakta daha iyi çözülmesi açısından önemlidir. Gerekli olduğu durumlarda yabancı otların çıkışı öncesi tatbik edilen **STILLO® 700 SC**'den sonra, tekrar çıkış sonrası uygulamalar yapılabilir.

Çıkış sonrası uygulama: **STILLO® 700 SC** yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu dönemde uygulanır. Uygulama sırasında yabancı otların aktif gelişimi devam etmeli ve herhangi bir stres koşulu altında olmaması gerekir. Uygulama sırasında şeker pancarı en az 2 gerçek yaprak döneminde olması gerekmektedir. Yabancı otların çıkışının devam ettiği durumlarda **STILLO® 700 SC**'nin tekrar uygulanması gerekebilir.

EKİM NÖBETİ:

STILLO® 700 SC uygulamasından sonra, şeker pancarı haricinde ancak 16 hafta sonra derin sürüm yapılarak ekim dikim yapılabilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

STILLO® 700 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C1,5 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, **STILLO® 700 SC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C1,5 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

STILLO® 700 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	C1,5	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	------	-----------------------------

700 g/l Metamitron

- Önce etiketi okuyunuz.
 - Evde kullanmayınız.
 - Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 - Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 - Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 - İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.**
- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz ile temasında: 15-20 dakika göz açıken bol su veya göz solüsyonu ile yıkayınız.

Çilt ile temasında: Elbiseleri çıkarın. Bitki koruma ürünü değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayınız.

Solunması halinde: Normal kullanım şartlarında zararlı etkisi yoktur. Uzun süre teneffüs edilmesi halinde hastayı bitki koruma ürünü uygulanmış alandan uzaklaştırın. Sıcak ve dinlenme pozisyonunda tutun. Tıbbi yardımda bulunun.

Yutulması halinde: Doktor veya Ulusal Zehir Danışma Merkezi'ni arayın. Hastayı kusturmaya çalışmayın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

® HEKTAŞ TİC. T.A.Ş.'nin tescilli markasıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR. 31 Ocak 2022

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Miktarı:

İÇİNDEKİLER:
Metamitron



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H400 Sucul ortamda çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.
P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
- Boş ambalajları başka bir amaç için kullanmayınız, usulüne uygun imha ediniz.

Dikkat: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız!

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışından bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze Osb Mahallesi 700. Sk. No: 711/1
Gebze / KOCAELİ
Tel: 0262 751 14 12
Fax: 0262 751 14 22



Özge KOYUNCU
Bitki Koruma Ürün Müdürü

U.İ.