

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 09.11.2006/5713

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml/da Kanyaşlar 15-25 cm boyda iken, bir ay sonra yeniden çıkışlar olursa ikinci bir uygulama yapılabilir.	56 gün
Soğan	Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>)	50 ml/da Yabani yulafların kardeşlenme döneminde	28 gün
	Darıcan Kanyaş (<i>Echinochloa crus-galli</i>) (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml/da soğanın 2 yapraklı devresinde	
Bağ*	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml/da Kanyaşlar 6-10 yapraklı veya 15-30 cm boyda iken	28 gün
	Köpekdişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>)	150 ml/da Köpekdişi ayrığı çiçeklenme öncesi devrede iken	
Mercimek	Yabani yulaf (<i>Avena fatua</i>) Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Kendi gelen arpa (<i>Hordeum vulgare</i>) Kendi gelen buğday (<i>Triticum aestivum</i>)	50 ml/da Bitkiler 2-6 yapraklı, çiçeklenme öncesi, Yabancı otlar ise 3-5 yapraklı iken	56 gün
	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml/da Kanyaşlar 15-30 cm boyda iken veya	
Şeker pancarı	Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>)	50 ml/da Yabani yulaflar kardeşlenme döneminde iken	56 gün
	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	75 ml/da Darıcanlar 10-12 cm boyda iken	
Patates	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	100 ml/da Kanyaşlar 15-20 cm, darıcanlar 8-10 cm boyda iken	28 gün
Kanola	Kendi gelen buğday (<i>Triticum aestivum</i>)	50 ml/da Buğday 2-4 yapraklı, 3-5 boyda	28 gün
	İtalyan çimi (<i>Lolium multiflorum</i>)	100 ml/da İtalyan çimi 2-4 yapraklı, 3-5 cm boyda iken	

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

BRACE® FORTE

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu A 1 Herbisit (Yabancıot ilacı)

150 g/l Fluazifop-p-butyl

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Bitki koruma ürününün yutulmasını takiben karın ağrısı ve ishalle birlikte mide bulantısı ve kusma görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

Cilt: Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurun.

Yutma: Hastayı kusturmuyunuz. Hastayı ve ilaç ambalajını derhal doktora gönderiniz. Bilinci kapalı hastaya ağızdan hiçbir şey vermeyin ve kusturmaya çalışmayın.

Solunum: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi yapılır.

© HEKTAŞ TİC. T.A.Ş.'nin tescilli markasıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Miktarı:

İÇİNDEKİLER:

Fluazifop-p-butyl
Aromatik hidrokarbonlar

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H226 Alevlenir sıvı ve buhar
H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki

ÖNLEM İFADELERİ:

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Sigara içilmez.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P405 Kilit altında saklayın.
P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Danışman

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
17 Aralık 2021



4. Rev.1

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye do, üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı ve uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Brace® Forte, geniş yapraklı kültür bitkilerinde sorun olan Gramineae familyasındaki tek ve çok yıllık yabancıotlara karşı çıkıştan sonra (post-em.) kullanılan sistemik etkili, selektif bir bitki koruma ürünüdür.

Brace® Forte uygulama ile hasat arası süreye uymak kaydı ile geniş yapraklı kültür bitkilerinin her döneminde kullanılabilir. Uygulama sırasında yabancıotların aktif gelişme içersinde olmaları daha iyi etki alınmasını sağlar. Daha önce kültürel işlemlerle, çok yıllık yabancıotların rizomları parçalanmışsa bu durum mücadeleden daha iyi sonuç alınmasını sağlar.

Uygulamada iyi bir kaplama için uygun basınç ve küçük damlacıklar gereklidir. Bunun için ilaçlama uygun basınçta (3 atmosfer) yapılmalıdır. Uygulama için yelpaze hüzmeli memeler en uygun olanıdır. Bitki koruma ürünü uygulamadan bir saat sonra yağın yağmurdan etiklenmez.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

Brace® Forte adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A 1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Brace® Forte**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A 1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan kullanınız.



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

BRACE® FORTE

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	A 1	Herbisit (Yabancıot ilacı)
-------	-----	----------------------------

150 g/l Fluaazifop-p-butyl

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışından bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze Osb Mahallesi 700. Sk. No: 711/1
Gebze / KOCAELİ
Tel: 0262 751 14 12
Fax: 0262 751 14 22



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

17 Aralık 2021



Rev.1