

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve Numarası:

ÜRÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu
Bağ*	Bağ salkımlı güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	40 adet feromon kapsül / da

ÖZELLİKLERİ:

Lobetec® 180 gün yayma süresi olan, bağ alanlarında bağ salkımlı güvesine (*Lobesia botrana*) karşı çiftleşmeyi engelleyici feromon içeren bir dispenserdir. Normal koşullarda yayıcı kapsüller en az 180 gün etkili olurlar.

ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Zararlı yoğunluğuna bağlı olarak dekara 40 yayıcı kapsül kullanılmalıdır. Ürün, ilk uçuştan itibaren asımlı hasata kadar kalmalıdır. İlk uçuşu tespit etmek için gözlemlene tuzakları erkenden asılmalıdır.

Optimum sonuç almak için homojen dağılım yapılmalıdır. Çeşide bağlı olarak ve güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmasına izin vermeden yayıcıları 1-2 metre yükseğe asınız, yayıcının kırılmasını önlemek için fazla sıkımayınız. Güneşe maruz kalan demir teller üzerine uygulamayınız. Erginlerin bitişik alanlardan girişini engellemek için bağ kenarlarına %5-10 oranında ürün asılması tavsiye edilir. Düzenli olarak zarar değerlendirmeleri yapılmalıdır. Belirlenen eşğin üzerinde olması durumunda tamamlayıcı uygulamalar yapılmalıdır.

Uygulama alanına 80-100 m'den daha yakın bir ilaçlı bağ varsa, buradan çiftleşmiş dişi bireylerin göçünü ve bulaşmayı engellemek yani izolasyonu sağlamak gerekmektedir. Bu nedenle, çiftleşmeyi engelleme yönteminin uygulandığı bağa sınır olan bağlara da 30 m genişliğinde feromon çubuklar asılarak tampon bölge oluşturulmalıdır.

Pestisit kullanımı yayıcı kapsüllerin çalışmasına zarar vermez. Bu sebeple gerekli durumlarda uygulama yapılabilir.

Ürünün sürekli olarak birkaç yıl boyunca uygulanmasıyla popülasyondaki azalmaya ulaşılabilir. Popülasyon düşük seviyelere düşürüldüğünde, sadece çiftleşmenin bozulması ile pratik olarak kontrol edilebilir.

Önemler: Küçük bağ alanlarında da bu teknik ile iyi kontrol sağlanır. Ancak başka bağlara bitişik olan küçük bağ alanlarında uygulanmamalıdır. Orta ve büyük alanlı bağlarda ilk uygulama yıllarında uygun bir insektisit ile karma bir strateji izlenebilir. İnsektisit kullanımı yayıcıların çalışmasını engellemez. Dolayısıyla her an müdahale edilebilir. Komşu bağlardan gelen döllenmiş dişiler yayıcı uygulanmış bağa yumurta bırakarak zarara neden olabilir. Böyle bir olasılığın varlığını saptamak; gereken yer ve zamanda insektisit ile müdahalede bulunmak için salkımlı özellikle salkımlı güvesi yumurta ve larvalarının beklendiği mücadeleye esas olan kritik zamanlarda haftada bir kontrol ediniz. En iyi sonuçlar geniş bağ alanlarında ve geniş çaplı uygulamalar yapıldığında elde edilir.

Kontroller: Lobetec® uygulanan bağlara gözlemlene tuzakları yerleştiriniz. Yayıcı kapsülün yayılan feromon konsantrasyonunun yeterli olup olmadığını haftada bir ergin kelebek yakalanması olup olmadığını kontrol ediniz. Salıkım güvesi riskine göre 1-2 haftada bir merkez omcılardan 200 salkımlı kontrol ediniz. Birinci döle veya uygulamanın ilk yıllarında çiçek veya salkımlı güvesi bulaşma oranı %6'dan fazlaysa zararlı yoğunluğunu düşürmek amacıyla biyolojik preparat kullanınız.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR
14 Nisan 2023



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

LOBETEC®

Feromon

Grubu	-	Feromon
-------	---	---------

Her bir feromon kapsül (yayıcı)
210 mg (E,Z)-7,9-dodecadien-1-yl acetate

- Önce etiketi okuyunuz.
 - Evde kullanmayınız.
 - Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 - Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 - Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 - İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Tahriş edici ürün, cilt veya mukoza zarlarıyla tekrarlanan veya uzun süreli temas kızarıklığa, kabarcıklara veya dermatite neden olabilir, sprey sisinin veya asılı parçacıkların solunması solunum yollarında tahrişe neden olabilir, bazı belirtiler hemen ortaya çıkmayabilir.

İLK YARDIM ÖNEMLERİ:

Göz ile temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.
Cilt ile teması halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

Yutulması halinde ağız bol suyla yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Doktor tarafından söylenmedikçe kusturulmamalıdır. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz.

Solunma halinde etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Gerekli görülmesi halinde suni teneffüs yaptırın. Doktora başvurulmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulayın.

® SEDQ HEALTHY CROPS'un tescilli markasıdır.

Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) Tel: 114

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

Ek-1

İÇİNDEKİLER:

(E,Z)-7,9-dodecadienyl-1-yl acetate
[1] 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H315 Cilt tahrişine yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P261 Tozunu ve dumanını solumaktan kaçının.
P262 Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P391 Doküntüleri toplayın.
P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.
- Yayıcı kapsüllerin kullanımında eldiven kullanılması tavsiye edilir. Kullanılan dağıtıcılar ve bunların ambalajları, artıkların bertaraf edilmesi yürürlükteki mevzuata göre yönetilmelidir.
- Yayıcı kapsüllerini kesmekten, delmekten ve açmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) depolarda orijinal ambalajında ve maksimum 4-5°C sıcaklıkta ağız açılmadan saklandığında iki yıl boyunca etkinliğini korur.

FİRMA BEYANI: Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyeler uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİCİ FİRMA:

SEDQ HEALTHY CROPS, S.L
C./Llull, 41
08005 Barcelona, İSPANYA

ÜRETİM TESİSİ:

SEDQ HEALTHY CROPS, S.L
Camino del Acipres s/n. 22400
Monzon- Huesca, İSPANYA

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.
Gebze OSB Mahallesi 700. Sk.
No: 711/1 41400
Gebze /KOCAELİ
Tel: 0262 751 14 12



REV.0