

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No.su: 06.05.2015 / 10231



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

BADOKS® 720 WG

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

Grubu	B	Herbisit (Yabancı Ot İlacı)
-------	---	-----------------------------

%38 Thifensulfuron methyl+ %19 Tribenuron methyl+
%15 Metsulfuron Methyl

**ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.**

**ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY
YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.**

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN
SOKMAYINIZ.**

**İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE
EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLDİĞİ DOZDA KULLANINIZ.**

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE
YASAKTIR.**

**KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ
SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA
TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Bilinçsiz bir kişiye ağızdan bir şey vermeyin. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, tıbbi yardım alın (Mümkün ise etiket gösterin).

Soluma: Temiz havaya çıkın. Solunum durmuş ise suni teneffüs yaptırın. Solunum zorluğu varsa oksijen verin. Zehir danışma merkezi veya doktoru arayın.

Yutma: Kusturmaya çalışmayın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz. Tıbbi yardım sağlayın ve ilaç ambalajını birlikte götürün.

Cilt: Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını bol su ve sabun ile yıkayın. Madde ile kirlenmiş elbise ve ayakkabıları çıkarıp, tecrit edin. Ciltte küçük bulaşma olmuşsa diğer kısımlara bulaşmasını engelleyin.

Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz açırken bol su ile yıkayın. Gerekirse derhal doktora başvurun.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

*Rotam Firması'nın tescilli markasıdır.

Ulusal Zehir Danışma Merkezi "UZEM" Tel: 114

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI	KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR	UYGULAMA DOZU ve ZAMANI
BUĞDAY	Farekulağı (<i>Anagallis arvensis</i>) Tarla köpek papatyası (<i>Anthemis arvensis</i>) Kokarot (<i>Bifora radians</i>) Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Uzun süpürge otu (<i>Descurania sophia</i>) Boynuzlu yoğurt otu (<i>Galium tricorutum</i>) Hakiki papatya (<i>Matricaria chamomilla</i>) Gönül hardalı (<i>Myagrum perforatum</i>) Trakya hardalı (<i>Neslia apiculata</i>) Zühre tarağı (<i>Scandix pecten-veneris</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Bülbül otu (<i>Sisymbrium officinale</i>) Arap baklasi (<i>Vaccaria pyramidata</i>) Adi yavşan otu (<i>Veronica hederifolia</i>) Doğu ballıbabası (<i>Wiedemannia orientalis</i>)	3 g/da Buğdayın kardeşlenme devresinde
ARPA	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Boynuzlu yoğurt otu (<i>Galium tricorutum</i>) Tarla köpek papatyası (<i>Anthemis arvensis</i>) Kokarot (<i>Bifora radians</i>)	3 g/da Arpanın kardeşlenme devresinde

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.


İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN

Dr. İre Başkan

N. Arıcan



24 Kasım 2021

TARIM VE ÇERMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net miktar:
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Thifensulfuron methyl, Tribenuron methyl,
Metsulfuron methyl

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanın.

P362+P364: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.

- Boş ilaç ambalajını herhangi bir maksatla için yeniden kullanmayınız.

- Gübre, insektisit ve tohumlardan ayrı yerde depolayınız.



REV.2

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ

Kullanma Zamanı:

Hububatın 1-2 yapraklı devresinden kın devresine (başak kın içinde)kadar olan dönem içinde güvenle kullanılabilir. En iyi netice yabancı otların erken gelişme dönemlerinde, yani yabancı otlar 4-8 yapraklı devrede iken ilaçlama yapıldığında alınır.

Kullanma Şekli:

BADOKS® 720 WG tavsiyeye uygun kullanıldıktan sonra ekimi yapılabilecek ürünler;

BADOKS® 720 WG uygulanmış Buğday hasadından sonra takip eden Sonbahar: Tahıllar, Yem bitkileri, Kanola (sürüm sonrası), Kışlık bezelye, Beyaz yonca, Mor yonca, Beyaz hardal.

BADOKS® 720 WG uygulanmış Buğday hasadından sonra takip eden İlbahar: Şeker pancarı, Bezelye, Sanayi bezelyesi(konservelik), Ayçiçeği, Mısır, Fasulye, Patates, Soya fasulyesi, Sorgum, Hindiba, Yerfıstığı.

Yukarıda yer almayan ürünler için **BADOKS® 720 WG** uygulamasından sonra 16 ay beklenmesi tavsiye edilir.

BADOKS® 720 WG uygulanmış buğday alanının herhangi bir nedenle bozulup tekrar ekiminin yenilenmesi gerektiğinde; ekimi mümkündür ve öncelikle derin sürüm yapılması ve sonrasında Baharlık buğday, Baharlık sert durum buğdayı ve Baharlık arpa ekilmesi tavsiye edilir.

Etki Şekli:

Yabancı otların büyümesi tatbikattan kısa bir süre sonra durur. Ancak ölüm belirtileri büyüme şartlarına, yabancı otların hassasiyetine bağlı olarak tatbikattan 1-3 hafta sonra görülür. Tatbikattan sonraki sıcak ve nemli şartlar **BADOKS® 720 WG'** nin etkisini hızlandırırken, soğuk ve kuru şartlar bunu geciktirir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

BADOKS® 720 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre "Grup B" olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **BADOKS® 720 WG'** nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmasına gerek yoktur. Eğer bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

BADOKS® 720 WG

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

Grubu	B	Herbisit (Yabancı Ot İlacı)
-------	---	-----------------------------

**%38 Thifensulfuron methyl+ %19 Tribenuron methyl+
%15 Metsulfuron Methyl**

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü(tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİCİ FİRMA:

ROTAM LTD.
Unit 6 26/F Trend Centre, 29 Cheung Lee Street,
Chai Wan, Hong Kong
Tel: 00852 2896 0662
Faks: 00852 2558 6577

ÜRETİM YERİ:

LANLIX CROPS SCIENCE CO., LTD.
No.79 Hsiang Yang Rd.,Chang Chih Township,
Ping Tung County 908, Tayvan

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze OSB Mahallesi 700.Sok.
No:711/1 41400 Gebze/KOCAELİ
Tel: (0 262) 751 14 12 (7 hat)
Fax: (0 262) 751 14 22



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

