

İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi. ( " )

Şarj No: (Damga ile)

Ruhsat tarih ve numarası: 06.02.2012/8569



TAKİMSAN TARIM KİMYA  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**RHYTHM® SC**

Süspansiyon konsantre (SC)

Grubu	D1:9	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	------	-------------------------

300 g/L Pyrimethanil

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz,

içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 12 saat süre ile insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :** Deri ve mukozayı tahriş eder. Baş ağrısı, halsizlik, ishal, metahomoglobinaya bağlı cyonosis'e neden olabilir.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:** Bitki koruma ürünü ile bulaşık elbiseleri derhal çıkarınız, hastayı ilaçlı alandan uzaklaştırınız.

**Deri temas halinde:** İlaçla temas eden kısımları su ve sabun ile yıkayınız.

**Göze temas halinde:** Göz kapakları açık olarak, temiz akan su altında en az 15 dakika yıkayınız. Belirtilerin devam etmesi halinde doktora başvurunuz.

**Yutulması halinde:** Hasta kendinde ise kusturunuz. Suni teneffüs yaptırınız. Belirtilerin devam etmesi halinde derhal doktora başvurunuz. İlacın etiketini veya ambalajını doktora gösteriniz.

**Solunması halinde:** Hastayı temiz havaya çıkartınız. Belirtilerin devam etmesi halinde derhal doktora başvurunuz.

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ :** Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız. Hastaya oksijen veriniz. Askorbik asit veya methylene blue kullanınız.

© TAKİMSAN TARIM KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN TESCİLLİ MARKASIDIR.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 11

Net Miktarı (kg veya lt)

Brüt ağırlık (kg)

Azami perakende satış fiyatı: Baskı

İÇİNDEKİLER:

Pyrimethanil

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf ediniz.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

Bitki Koruma Ürününün Kullanılacağı Bitki Ve Zararlı Organizmalar

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Bağ*	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	100 ml/100 L su	21 gün
Domates	Sebzelerde Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	125 ml/100 L su	3 gün
Elma	Karaleke ( <i>Ventruia inaequalis</i> )	50 ml/100 L su	14 gün
Biber (Sera)	Sebzelerde Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	125 ml/100 L su	3 gün
Patlıcan (Sera)	Sebzelerde Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	125 ml/100 L su	3 gün

\*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

**KALİBRASYON:**

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:**

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



18 Aralık 2023  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



## BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

### Bağda kurşuni küf:

Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde:

- 1.uygulama: Tanelerin olgunluk başlangıcında,
2. ve diğer uygulamalar: Kullanılan ürünün etki süresi dikkate alınarak (10-15 gün ara ile) yapılmalıdır. Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

Ege, Marmara ve Doğu Anadolu Bölgelerinde:

- 1.uygulama: Çiçeklenmeden hemen önce,
- 2.uygulama: Kapalı salkım döneminde,
3. ve diğer uygulamalar: Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

### Domateste kurşuni küf:

Uygulamaya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır. Uygulamalara 10 gün arayla hastalığın seyrine göre devam edilir. Uygulama iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

### Biber (Sera), Patlıcan (Sera) kurşuni küf:

Uygulamaya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır. Uygulamalara 10 gün arayla hastalığı seyrine göre devam edilir. Uygulama iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

### Elma karalekesi:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. Uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süreleri dikkate alınarak (10-14 gün ara ile) ile uygulanmalıdır.

### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Rhythm® SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup D1:9 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Rhythm® SC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup D1:9 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:** Rhythm® SC alüminyum içeren ilaçlarla karıştırılarak kullanılmaz. Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.



**TAKİMSAN TARIM KİMYA  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**RHYTHM® SC**

Süspansiyon konsantre (SC)

Grubu	D1:9	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	------	-------------------------

300 g/L Pyrimethanil

### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürünü karışımının tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Rüzgarlı havada uygulama yapmayınız.
- Bekleme süresine uyunuz.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.

### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürününün kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

### RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

TAKİMSAN TARIM KİMYA SANAYİ  
VE TİCARET A.Ş.  
Gebze OSB Mahallesi 700. Sk. No: 711/1  
41400 Gebze / KOCAELİ  
Tel: 0262 751 14 12  
Fax: 0262 751 37 30

### ÜRETİCİ FİRMA:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.  
Gebze OSB Mahallesi 700. Sk. No: 711/1  
41400 Gebze / KOCAELİ  
Tel: 0262 751 14 12  
Fax: 0262 751 14 22



18 Aralık 2023  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.  
Zah.