



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	86
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat) SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	35280
Marka veya Ticari Adı(varsa)	BOOSTER ZnMo
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.
Gübre Tip İsmi	Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat) SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Molibden(Mo): 1,5, Suda Çözünür Çinko(Zn): 2,5
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İthalat
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1,16-5,8-11,6-23,2 Kg 1-5-10-20 Lt
Depolama Sıcaklığı	+5/+35 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Uyarılar, Parti Seri No, Parti No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı, Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız, Firma Beyanı, Klor İçeriği: 0,6
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 03/02/2020 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih: 03/02/2020


Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

EC FERTİLİZER
Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat)
SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
BOOSTER ZnMo

GARANTİ EDİLEN İÇERİK :	%W/W
Suda Çözünür Molibden (Mo)	1,5
Suda Çözünür Çinko (Zn)	2,5

KLOR İÇERİĞİ % 0,6

KULLANIM TAVSİYELERİ UYGULAMA ŞEKLİ

MINIMUM SEYRELTME: 1: 100 oranında seyreltme, 1 kısım ürün: 100 kısım su anlamına gelir. Sıcak havalarda daha yüksek seyreltme oranı kullanın.

ÜRÜN	Doz/ Dekar	Minimum Seyreltim Oranı	TAVSİYELER
MUZ-YAPRAK UYGULAMASI	110 ML	1:300	Her 45 günde bir uygulayın. Sath uygulamaları için maksimum uygulanabilir su hacminde uygulayınız.
HUBUBAT / BAKLAGİLLER			
Yaprak uygulaması	35-140 ml	1:50	3 - 5 yaprak aşamasında veya erken büyüme aşamalarında bir kez uygulayın ve 4 - 5 hafta sonra tekrarlayın. Activist Zinc veya Activist Max Zinc ile birlikte kullanın
PAMUK – Yaprak uygulaması	70 - 140 ml	1:20	Ekimden 21 gün sonra uygulayın, ilk tomurcukta tekrarlayın
KABAKGİLLER – Yaprak uygulaması	70 - 140 ml	1:300	Ekimden 3 - 4 hafta sonra uygulayın. Fide dönemindeki uygulamalarda 100 - 200 L suda 3 L seyreltin ve bandırın yada dikimden hemen sonra kök çevresine uygulayın.
Ekim anında daldırma	200 - 300 ml	1:50	
KESME ÇİÇEK – Yaprak uygulaması	0.7 – 2.1 ml / 1 L su		Yapraktan, büyüme dönemi boyunca 3-4 hafta aralıklarla uygulanır. Her kesimden sonra ve ayrıca tomurcuk oluşumundan önce tekrarlanır.
Damlama Sulama ile	200 - 400 ml		Topraktan, çıkıştan sonra uygulanır
MEYVA AĞAÇLARI – Yaprak uygulaması	70 - 210 ml		Aktif büyüme dönemi boyunca 4-5 haftalık aralıklarla uygulayın.
Şaşırtma Sulama suyu ile	1 - 2 mL / bitki	1:300	1 - 2 L suyla seyreltin, şaşırtma döneminde fideleri bandırın yada erken ilkbaharda uygulayın.
Sulama – Damlama Sulama ile	200 - 400 ml		Tomurcuk kabarma döneminde
SÜS BİTKİLERİ			
Yaprak uygulaması	0.7 – 2.1 ml / 1 L su		Aktif büyüme mevsimi boyunca yapraktan 5-6 hafta aralıklarla uygulanır .Toprak uygulaması - şaşırtmada yada ilkbaharda uygulanır
Şaşırtma- Damlama Sulama ile	200 - 300 ml		
PATATES – Yaprak uygulaması	70 - 140 ml	1:300	Çıkış tamamlandıktan 28 gün sonra ilk, 14 gün sonra ikinci uygulamayı yapın. Yumru oluşumundan sonra uygulamayın. (Bu, çeşide bağılı olarak çiçek başlangıcından önce veya aynı anda olabilir)
Yada Sıra arası	200 - 400 ml	1:30	Dikimde uygun pestisitler ile uygulayın

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsandede Cad
700. Sokak Gebze / KOCAELİ
Posta Kodu: 41400 Nilüferbey V.D. 461 001 5898

ÇİLEK			
Yaprak uygulaması	70 - 140 ml	1:300	Ekimden 21 gün sonra uygulayın. Her 2. toplamada tekrarlayın.
Dikim bandırma	0.3 mL / bitki	1:30	Dikimden hemen önce (kökleri de dahil olmak üzere alt üçte) bandırma
YEŞİL ALANLAR Yaprak uygulaması	35 mL /100 m2	1:300	Dikimde uygulayın. Gerekteğinde ayhk tekrarlayın
SEBZE - Yaprak	70 - 140 ml	1:300	Kök büyümesini teşvik etmek için 3 yaprak döneminde yaprakdan uygulanır ve daha sonra aktif büyüme dönemi boyunca 3 - 4 haftalık aralıklarla.
Şaşırtma- Damlama sulama ile	0.3 ml/ bitki	1:30	Şaşırtmadan önce ideleri bandırın (dipleri de dahil olmak üzere alt üç) yada dikimden sonra kök çevresine uygulayın
BAĞ			
Yeni fidelik:			
Şaşırtma anında kök bandırması	0.3 mL / bitki	1:30	Dikimden hemen önce bandırma (dipleri de dahil olmak üzere alt üçüncü)
Toprak uygulaması	100 - 300 ml	1:60	Yeni dikilmiş fidelerde hemen yada tomurcuların kabarma döneminde ,kök çevresine 500 ml sevretilmiş üründen uygulayınız.
Gelişmiş Bağlarda			
Yaprak uygulaması	140 - 210 ml	1:100	Çiçeklenme döneminde uygulayın ve 21 gün sonra tekrarlayın.
Sulama Suyu ile	300- 400 ml		Damlamadan tomurcuk kabarma döneminde uygulayın ve çiçeklenme döneminde tekrarlayın. Sadece yaprak veya damlama olarak uygulayın.

KARIŞABİLİRLİK: BOOSTER ZnMo çok çeşitli yaygın olarak kullanılan pestisitler ve diğer ürünler ile uyumludur. Diğer kimyasallarla karıştırırken daima küçük bir miktar karıştırın ve karışımdaki çökeltiyi kontrol edin. Çökeltme meydana gelirse, uygulamaya DEVAM ETMEYİN. Karışım çökmezse ve bu ürün kombinasyonunu ilk defa kullanıyorsanız, tüm mahsulün muamelesinden önce mahsulün küçük bir alanını test edin.

UYARILAR:

Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No: Lisans No: Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi Parti No: Net Ağırlık:

İTHALATÇI FİRMA: HEKTAŞ TİCARET TÜR.K.A.Ş

ADRES: Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsandede Cad.700.Sok. 41480 GEBZE/KOCAELİ
Tel: 0(262) 751 14 12 **FAX:** 0(262) 751 14 22

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Gebze Organize San. Böl. İhsandede Cad.
700. Sok. Gebze / KOCAELİ
Ticari Kodu: 41480 / Yasbey V.D. 461 001 5836

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi