

İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi: (")
Şarj No: (Damga ile)
Ruhsat tarih ve no.su: 07.06.2016/10673

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu |
|-----------------|--|-------------------|
| Turunçgil* | Turunçgil kırmızı kabuklubiti (<i>Aonidiella aurantii</i>) | 1500 ml/100 L su |
| Hıyar (Sera) | Kırmızıörmücekler (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>) (<i>Tetranychus urticae</i>) | 800 ml/ 100 L su |
| Armut | Armut psillidi (<i>Cacopsylla pyri</i>) | 1500 ml /100 L su |
| Şeftali | Dut kabuklubiti (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>) | 3 L/100 L su |
| Elma | San jose kabuklubiti (<i>Diaspidiotus perniciosus</i>) | 2,5 L/100 L su |

*Turunçgilde faydalılara zararsız olduğu tespit edilmiştir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

Hıyarda kırmızıörmücekler karşı yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızıörmücek görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Armutta armut psillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı, sürgünlerin %15'den fazlasında bulaşma görülmeye başladığı, tatlımsı madde akıntısının başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

06-09-2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

HEKTAŞ SARRİTOR®

Emülsiyon konsantre (EC)

| Grup | | İnsektisit-Akarisit (Böcek ve Kırmızıörmücek İlacı) |
|------|---|--|
| | - | |

800 g/l Parafinik Mineral Yağ

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ. SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Göz ile teması halinde: Göz kapaklarını açık tutarak bol su ile yıkayınız. Kızarıklık veya ağrı varsa doktora kontrol ettirilmelidir.

Deri ile teması halinde: Bol su ve sabun ile iyice yıkanmalıdır. Kirlenen elbiseyi çıkarıp temas eden cilt yıkanmalıdır. Ciltteki tahriş geçmezse doktora götürülmelidir.

Yutulması halinde: Bol miktarda yutulması durumunda zorla kusturulmadan doktora götürülmelidir.

Solonması halinde: Gaz solunması sonucu burun ve boğazda tahriş veya öksürük varsa etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Belirtiler devam ederse doktora götürülmelidir.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır.

® HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş'nin tescilli markasıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

Net Miktarı (kg veya lt)
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:
Parafinik mineral yağ

ZARARLILIK İŞARETLERİ: -

ZARARLILIK İFADELERİ (H):
Sınıflandırılmamıştır.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Hektaş Sarritor'un 5°C altında ve 32°C üstündeki sıcaklıklarda uygulanması tavsiye edilmez. Isı kontrolü gölgede yapılmalıdır.
- İlaçlama yapılacak bahçenin sulanmış olması tavsiye edilir.
- Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.



Şeftalide dut kabuklubitine karşı uygulamalar birinci ve ikinci döllere karşı uygulanır. İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Elmada san jose kabuklubitine karşı kış uygulaması olarak ocak-mart ayları arasında gözler uyanmadan uygulama yapılır. Erken ilkbahar mücadelesi olarak pembe tomurcuk döneminde larvalara karşı uygulama yapılır. Yaz mücadelesi olarak çiçekten sonra zararlının yavrulama başladıktan sonra ilk uygulama yapılır. Bitki koruma ürününün etki süresi takip edilerek gerekiyorsa ikinci uygulama yapılır.

Turuncgilde kabuklubitlere karşı 100 yaprağa düşen *A. aurantii* miktarı 50'den fazla ise uygulama yapılmalıdır. Uygulama yazın eşeysel çekici tuzaklarda ergin sayısı maksimuma ulaştığında, ilk hareketli nimfler görüldükten yaklaşık 15 gün sonra yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Direnç gelişimini geciktirmek için Hektaş Sarritor®'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.

KARIŞABİLİRLİLİK DURUMU:

Hektaş Sarritor® kükürt, captan ve folpet aktif madde bitki koruma ürünleri ile karışmaz. Şayet söz konusu bitki koruma ürünleri bitkiye uygulanmış ise Hektaş Sarritor® uygulaması için 20 gün beklemek gerekmektedir. Hektaş Sarritor® tek başına kullanılmalıdır.



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

HEKTAŞ SARRİTOR®

Emülsiyon konsantre (EC)

| | | |
|------|---|--|
| Grup | - | Insektisit-Akarisit (Böcek ve Kırmızıörümcek İlacı) |
|------|---|--|

800 g/l Parafinik Mineral Yağ

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze OSB Mahallesi 700. Sk. No: 711/1
Gebze / KOCAELİ
Tel: 0262 751 14 12
Fax:0262 751 14 22



Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

06-09-2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

