

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 06.05.2010 - 7703

KULLANILACAGI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU
DOMATES (Sera)	Çökerten ve Fide kök çürüklüğü <i>Pythium spp.</i> <i>Rhizoctonia sp.</i> <i>Alternaria spp.</i> <i>Fusarium spp.</i> <i>Fusarium oxysporum</i>	250 g / da
BİBER (Sera)	Çökerten ve Fide kök çürüklüğü <i>Rhizoctonia solani</i> <i>Fusarium oxysporum</i> <i>Fusarium spp.</i>	250 g / da
Çilek	Kök ve Kök Boğazı çürüklüğü <i>Fusarium oxysporum</i> <i>Macrophomina phaseolina</i> <i>Pythium spp.</i> <i>Rhizoctonia solani</i>	300 g / da

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ:

REMEDIER *T. aspellorum* ırk ICC 012 % 2 + *T. gamsii* ırk ICC 012 % 2 ihtiva eden antagonistik etkili koruyucu biyolojik fungisitir. *Pythium spp.*, *Rhizoctonia sp.*, *Alternaria spp.*, *Fusarium spp.* gibi toprak mantarlarına karşı kök sistemini koruyucu olarak kullanılır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

DOMATES FİDELİK: REMEDIER II solüsyon ilaçlamadan 24 – 36 saat önce hazırlanır. Böylece konidilerin çimlenmesi sağlanır. 250 g Remedier 3 Lt suda eritilir. Zaman zaman bu solüsyon karıştırılır. Tatbikat dozu bu karışımdan hesaplanır. **1. UYGULAMA:** Tohum ekiminden 7 gün önce konik hüzneli meme kullanılarak yapılır. Toprak yüzeyi homojen bir şekilde ilaçlanır. Kalibrasyon yapılarak 1 m² ye 3 Lt su + REMEDIER kullanılır.

2. UYGULAMA: Tohum ekiminden hemen sonra konik hüzneli meme kullanılarak yapılır. Toprak yüzeyi homojen bir şekilde ilaçlanır. Kalibrasyon yapılarak 1 m² ye 3 Lt su + REMEDIER kullanılır.

DOMATES SERA – FİDE UYGULAMASI: REMEDIER II solüsyon uygulamadan 24 – 36 saat önce hazırlanır. Böylece konidilerin çimlenmesi sağlanır. 250 g Remedier 3 Lt suda eritilir. Zaman zaman bu solüsyon karıştırılır. Tatbikat dozu bu karışımdan hesaplanır. **1. UYGULAMA:** Fide ekiminden 7 gün önce ölçekli kap ile tatbik edilir. Dekara 250 g REMEDIER kullanılır. Fide sayısı 100 ml ile çarpılıp dekara düşecek su miktar hesaplanır. Dekara düşecek su içine 250 g Remedier 3 Lt suda eritilmiş solüsyon konur. Her bir fide dibine bu ilaçlı sudan 100 mL ölçekli kapla tatbik edilir. **2. UYGULAMA:** Fide ekiminden 1 gün sonra ölçekli kap ile tatbik edilir. Dekara 250 g REMEDIER kullanılır. Fide sayısı 100 ml ile çarpılıp dekara düşecek su miktar hesaplanır. Dekara düşecek su içine 250 g Remedier 3 Lt suda eritilmiş solüsyon konur. Her bir fide dibine bu ilaçlı sudan 100 mL ölçekli kapla tatbik edilir.

BİBER SERA – UYGULAMASI: REMEDIER II solüsyon uygulamadan 24 – 36 saat önce hazırlanır. Böylece konidilerin çimlenmesi sağlanır. 250 g Remedier 3 Lt suda eritilir. Zaman zaman bu solüsyon karıştırılır. Tatbikat dozu bu karışımdan hesaplanır. **1. UYGULAMA:** Fide ekiminden 7 gün önce ölçekli kap ile tatbik edilir. Dekara düşecek su içine 250 g Remedier 3 Lt suda eritilmiş solüsyon konur. **2. UYGULAMA:** Fide ekiminden hemen sonra dekara 250 g REMEDIER kullanılır.

ÇİLEK – KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ: REMEDIER II solüsyon uygulamadan 24 – 36 saat önce hazırlanır. **1. UYGULAMA:** Fide ekiminden 7 gün önce ölçekli kap ile tatbik edilir. Dekara düşecek su içine 300 g Remedier 3 Lt suda eritilmiş solüsyon konur. **2. UYGULAMA:** Fide ekiminden 1 gün sonra dekara 300 g REMEDIER 3 Lt eritilmiş solüsyon içerisinde damlama sulama ile uygulanır. **3. UYGULAMA:** Fide ekiminden 15 gün sonra dekara 300 g REMEDIER 3 Lt eritilmiş solüsyon içerisinde damlama sulama ile uygulanır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

KARİŞİLEBİLİRLİK: REMEDIER'in yalnız tatbik edilmesi tavsiye edilir. Savet diğer ilaçların kullanılmasını izlenmelidir. REMEDIER tatbikatından 10 gün sonra tatbik edilir. 1

23 Ekim 2017

GIDA TARAFINDAN YEREL YEREL İZLENİMLERİ
GIDA VE İLAHATLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
RABUL KURUMUŞTIR.

TANCAN REMEDIER®

İsılanabilir Toz (WP)

10⁸ cfu / g

Trichoderma aspellorum ırk ICC 012
Trichoderma gamsii ırk ICC 080

GRUBU	Biyolojik Fungisit (Mantar İlacı)
-------	--------------------------------------

Önce etiketi okuyunuz
Evide kullanmayınız
Bitki koruma ürünü uygulandıktan 4 saat insan ve hayvan solamayınız
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Göz ve cilt ile temas halinde alerjik reaksiyon oluşturabilir

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunum: Hastayı açık havaya çıkarın. Hastayı rahat ve sıcak bir yerde tutun. Solunum güçlüğü varsa oksijen verin. Soluk alıp verme düzenli değilse veya durmuşsa suni solunum uygulayın. Doktora veya Ulusal Zehir Danışma merkezine ulaşın. **Yutma:** Ağzı iyice yıkayın. Bol su içirin. Hastayı hiçbir şekilde kusturmaya zorlamayın. Bilinç yerinde değilse ağzından bir şey vermeyin. Ürün etiketi veya Güvenlik Bilgi Formu ile beraber tıbbi yardım alın. **Ciltle Temas:** Derhal ürünün bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yeri 15 dakika boyunca akan su ve sabun ile yıkayın. İlacın bulaştığı giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın. Tüm vücut teması varsa duş alın. Tahriş oluşur ve devam ederse tıbbi yardım alın. **Gözlerle Temas:** Kontakt lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

Özel bir antidotu yoktur.

UZEM Ulusal Zehir Merkezi Tel: 114
® Isagro SpA'nın tescilli markası

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:
İÇİNDEKİLER

Trichoderma aspellorum ırk ICC 012
Trichoderma gamsii ırk ICC 080

ÖNLEM İFADELERİ

P102. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P262. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin
P270. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin
P280. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P420. Diğer malzemelerden uzakta depolayın
P501. İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin
EUH401. İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanımı talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İlaç atıklarını su kaynaklarına bulaştırmayın.
Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha edin.

İlacın ambalajında kapalı olarak muhafaza edin.

DEPOLAMA DURUMU

Dondurmayın. Daima + 30 °C'nin altındaki sıcaklıkta muhafaza edin. Depo sıcaklığı + 4 °C'nin altında ve 27 °C'nin üzerinde olmamalıdır. Doğrudan güneş ışığında bırakmayın.

Serin ve rutubetsiz depolarda muhafaza edin.

Normal depo şartlarında orijinal ambalajında muhafaza edildiğinde biyolojik etkisini, fiziksel ve kimyasal özelliğini 15 – 18 ay muhafaza eder.

İMALATÇI FIRMA:

ISAGRO S.p.A. Centro Uffici San Siro Edificio D-ala 3 Via Caldera 21
20153 Milano - İTALYA

FABRİKA:

ISAGRO S.p.A. Via Nettunse Km. 23400 Aprilla (Latina) - İTALYA

RUHSAT SAHİBİ:

TANCAN Dış Ticaret Limited Şirketi Karaman Çiftlik Yolu Eston Blokları Sahibi
Çamı Bloğu K:14 Daire:51 İçerenköy İstanbul Tel: +90-216-4690190

TANCAN Dış Ticaret Ltd. Şti.

Karaman Çiftlik Yolu Eston Blokları

Sahil Çamı Bloğu Kat 14 Daire 51

İçerenköy 34752 İstanbul TURKEY

Tel.: +90 216 469 0190

Karşıyaka/İstanbul Tel: +90 216 469 7442

Dr. Can Atilla

