

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 13.07.2020/11671

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (sera)	Patlıcangillerde külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	100 ml/100 L su	3 gün
Domates (tarla)	Yaprak küfü (<i>Fulvia fulva</i> = <i>Cladosporium fulvum</i>) Septorya yaprak lekesi (<i>Septoria lycopersici</i>) Erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	60 ml/da	3 gün
Bağ *	Bağ küllemesi (<i>Erysiphe necator</i>) Bağ mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>) Bağda ölül (<i>Phomopsis viticola</i>)	80 ml/100 L su	21 gün
Antepfıstığı	Antepfıstığında karazenk (<i>Pseudocercospora pistacina</i>)	100 ml/100 L su	21 gün
Hıyar (sera)	Kabakgillerde külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> = <i>Podosphaera xanthii</i>) Kabakgillerde mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	80 ml/100 L su	3 gün
Hıyar (tarla)	Kabakgillerde külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> = <i>Podosphaera xanthii</i>)	75 ml/da	3 gün
Kornişon (sera)	Kabakgillerde külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> = <i>Podosphaera xanthii</i>) Kabakgillerde mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	80 ml/100 L su	3 gün
Kornişon (tarla)	Kabakgillerde külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> = <i>Podosphaera xanthii</i>)	75 ml/da	3 gün
Kabak (sera)	Kabakgillerde mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	80 ml/100 L su	3 gün
Nar	Narda kahverengi leke (<i>Alternaria alternata</i>)	80 ml/100 L su	21 gün
Biber (sera)	Patlıcangillerde külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	100 ml/100 L su	3 gün
Patlıcan (sera)	Patlıcangillerde külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	100 ml/100 L su	3 gün
Patlıcan (tarla)	Patlıcangillerde külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	90 ml/da	3 gün
Patates	Erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	60 ml/da	14 gün
Kavun	Kabakgillerde külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> = <i>Podosphaera xanthii</i>) Kabakgillerde alternarya yaprak yanıklığı (<i>Alternaria cucumerina</i>)	75 ml/da	3 gün
		80 ml/100 L su	3 gün



HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.

ALDEID®

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	C3,11	G1,3	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	-------	------	-------------------------

200 g/l Azoxystrobin + 125 g/l Difenconazole

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.**
- KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/4'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHRİLENME BELİRTİLERİ:

Gözler, burun, boğaz ve deride tahriş, baş dönmesi ve ağrısı, halsizlik, net görememe, mide bulantısı.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.
Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.
İçit: Temas halinde elbiselerini çıkarın. Bitki koruma ürünü değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.
Yutma: Ağzı bol suyla yıkamalı ve doktora başvurulmalıdır. Doktor tarafından söylenmiş edikçe kusturulmamalıdır. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz.
Soluma: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Gerekli görülmesi halinde suni teneffüs yaptırın. Doktora başvurulmalıdır.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

* HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.'nin tescilli markasıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114



Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Miktarı:

İÇİNDEKİLER:
Azoxystrobin
Difenconazole

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H332 Solunması halinde zararlıdır.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P280 Korumaya eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanınız.
P501 İçeriği/ kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf ediniz.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.

Dikkat: Bitki koruma ürününü kullanmadan önce iyice çalkalayınız!

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uyumadığı eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

Özgür Koyuncu
Bitki Koruma Ürün Müdürü

Rev.7

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

08 Eylül 2020

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Karpuz	Kabakgillerde alternarya yaprak yanıklığı (<i>Alternaria cucumerina</i>)	80 ml/100 L su	3 gün
	Kabakgillerde külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> = <i>Podosphaera xanthii</i>)	75 ml/da	3 gün
Ispanak	Ispanak yaprak lekesi (<i>Cladosporium variabile</i>)	100 ml/da	3 gün
Armut	Armut karalekesi (<i>Venturia pirina</i>)	75 ml/100 L su	14 gün
Nohut	Nohut antraknozu (<i>Ascochyta rabiei</i>)	80 ml/da	14 gün
Havuç	Külleme (<i>Erysiphe heraclei</i> , <i>Leveillula taurica</i>)	80 ml/da	3 gün
Zeytin	Zeytinlerde halkalı leke (<i>Spilocaea oleaginea</i> = <i>Cyclogonium oleaginum</i>)	100 ml/100 L su	21 gün



HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.

ALDEID®

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu C3,11 G1,3 Fungisit (Mantar ilacı)

200 g/l Azoxystrobin + 125 g/l Difenconazole

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:
HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.
Gebze OSB Mahallesi 700. Sk. No: 711/1
41400 Gebze / KOCAELİ
Tel: 0262 751 14 12
Fax: 0262 751 14 22



* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Kabakta (sera) mildiyö için bitkinin gelişimi ve fenolojisine göre 50-100 L/da ilaç su kullanılabilir.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ :

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domates (sera), biber (sera) ve patlıcanda (sera, tarla) külleme karşı ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-14 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Domateste (tarla) yaprak küfüne karşı yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir.

Domates (tarla) ve patateste erken yaprak yanıklığına karşı gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ürünün etki süresine bağlı olarak uygulama tekrarlanmalıdır.

Domateste (tarla) septorya yaprak lekesine karşı ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulama yapılır.

Bağda külleme karşı 1. uygulama çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde, 2. uygulama çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde, 3. uygulama çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde, 4. ve diğer uygulamalar üçüncü uygulamada kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre ve tanelere ben düşme dönemine kadar uygulanır.

Bağda mildiyöye karşı ilk uygulamaya sürgünler 25-30 cm'ye ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar ilk uygulamada kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi, hastalığın gelişme durumu ve meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile yapılmalıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

08 Eylül 2026



HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.
Özgür Koyuncu
Bitki Koruma Ürün Müdürü

Bağda ölü kola karşı;

Dormant dönem ilaçlaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan (tomurcuk patlamasından) 3-4 hafta önce dormant dönem uygulaması yapılır.

Yeşil aksam ilaçlaması: Vegetasyon döneminde aşağıdaki programa göre yapılır.

1. İlaçlama: Gözlerin uyanma (Tomurcuk patlaması) başlangıcında,
2. İlaçlama: Sürgünler 8-10 cm uzunluğa ulaştığı dönemde,
3. İlaçlama: Çiçeklenme döneminden hemen önce (çiçek salımlarının belirdiği dönemde),
4. İlaçlama: Çiçeklenme sonu-tane seti oluşumu başlangıcında yapılmalıdır.

Antepfıstığına karazenke karşı;

1. İlaçlama: Koruyucu fungusitlerle mücadele yapılacaksa, uygulamaların mutlaka ilk enfeksiyonlardan önce, yaprakların açılmaya başladığı dönemde; tedavi edici fungusitlerle mücadele yapılacaksa meyveler nohut tanesi iriliğinde ve yapraklar tam olarak açıldığı dönemde yapılmalıdır. Ayrıca, tedavi edici fungusitlerle ilk belirtilerin görüldüğü döneme kadar uygulama yapılabilir.

2. İlaçlama ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan ilaçların özelliği, etki süreleri ve yağış durumu dikkate alınarak 15 gün aralıklarla yapılır.

Hıyar (sera) ve komışonda (sera) külemeye karşı İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya 12-14 gün ara ile devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 °C'nin üstünde ve orantılı nemin de %50'nin altında olduğu zamanlarda uygulamalara ara verilmelidir.

Hıyar (sera) ve komışonda (sera) mildiyöye karşı uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisi görülmesi ile başlanır ve hastalığın şiddetine göre devam edilir. Uygulamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Kabakta (sera) mildiyöye karşı uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisi görülmesi ile başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla devam edilir. Uygulamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Bir üretim sezonunda en fazla 3 uygulama yapılır.

Narda kahverengi lekeye karşı 1. uygulama çiçek tomurcukları belirginleşmeye başladığında, 2. uygulama taç yapraklar döküldüğünde, 3. uygulama meyveler yan büyüklüğe geldiğinde yapılmalıdır.

Hıyar, komışon, karpuz ve kavunda kabakgillerde külemeye karşı ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C'nin üstünde ve orantılı neminde %50'nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Kavun ve karpuzda alternarya yaprak yanıklığına karşı uygulamalar yeşil aksam uygulaması şeklinde yapılır. Çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamalara başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve uygulamaların etkinlik süresi dikkate alınarak 10-12 gün aralıklarla devam edilir.

İspanakta yaprak leke hastalığına karşı uygulama hastalık koşullarının oluşmaya başladığı ve enfeksiyon riskinin yükseldiği dönemde yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır. Diğer uygulamalar ise 10' ar gün ara ile 3 uygulama şeklinde yapılır.

Armutta karalekeye karşı;

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır)
2. Uygulama: Beyaz rozet döneminde
3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 döküldüğü,
4. ve Diğer Uygulamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünün etki süresi dikkate alınarak uygulanır.

Nohutta nohut antraknozuna karşı;

Uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 10°C ve orantılı nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak 10 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Uygulamaların yapıldığı gün şiddetli yağış olmuştaysa uygulama tekrarlanmalıdır.

Havuçta külemeye karşı hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Zeytinde halkalı lekeye karşı;

Marmara Bölgesinde:

1. Uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Ege Bölgesinde:

1. Uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
 2. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
 3. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
- Tüm ilaçlamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

Akdeniz Bölgesinde:

1. Uygulama: Hasattan sonra,
2. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
3. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

**HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.****ALDEID®****Süspansiyon Konsantre (SC)**

Grubu	C3,11	G1,3	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	-------	------	-------------------------

200 g/l Azoxystrobin + 125 g/l Difenoconazole

HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.
Oğuz Koyuncu
Bitki Koruma Ürün Müdürü



08 Eylül 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MÜHÜR

ALDEID® hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ALDEID® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3,11 + G1,3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, ALDEID®'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3,11 + G1,3 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılması önerilmez.



HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.

ALDEID®

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	C3,11	G1,3	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	-------	------	-------------------------

200 g/l Azoxystrobin + 125 g/l Difenoconazole



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL, ÇEVRE VE KLİMA BAKANLIĞI
KABUL EDİLMİŞTİR

08 Eylül 2026