

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No.su: 04.03.2008/6258

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönem	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Buğday	Kokar ot (<i>Bifora radians</i>)	100 ml/da Buğdayın kardeşlenme döneminde, kokar otun 2-4 yapraklı devresinde kullanılır.	-
Şekerpancar	Kokar ot (<i>Bifora radians</i>) Eğik başlı kangal (<i>Carduus nutans</i>) Peygamber çiçeği (<i>Centaurea cyanus</i>) Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>) Dikenli yabani marul (<i>Lactuca serriola</i>) Papatya (<i>Matricaria</i> spp.) Kanarya otu (<i>Senecio vulgaris</i>) Adi eşek marulu (<i>Sonchus oleraceus</i>)	100 ml/da Şekerpancar ve yabancı otar çıktıktan sonra, yabancı otların 2-4 yapraklı devresinde kullanılır.	-
Kanola	Tarla köpek papatyası (<i>Anthemis arvensis</i>) Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>) Yabani krizantem (<i>Chrysanthemum segetum</i>) Balıbbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>) Hakiki papatya (<i>Matricaria chamomilla</i>) Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>) Sarmaşık çobançeşmesi (<i>Polygonum convolvulus</i>) İmam kavuğu (<i>Senecio vulgaris</i>) Kuş otu (<i>Stellaria media</i>) Karahindiba (<i>Taraxacum officinale</i>) Devetabanı (<i>Tussilago farfara</i>) Adi yavşan otu (<i>Veronica hederifolia</i>) Yabani fığ (<i>Vicia</i> spp.)	100 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların erken gelişme döneminde kullanılır. (2-6 yaprak)	-
Soğan	Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>)	50 ml/da Soğan ve köygöçüren çıktıktan sonra, köygöçürenin 2-4 yapraklı devresinde kullanılır.	-
İspanak	Kırmızı köklü bitki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Balıbbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>) Kuş otu (<i>Stellaria media</i>)	100 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların 2-4 yapraklı devresinde kullanılır.	42 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karşıtırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanırken depoya kadar karşıtırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmak, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.



HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.

PHAETON® 100

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	0,4	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	-----	-----------------------------

100 g/l Clopyralid

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHRİLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulantı ve görmede bulanıklık görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz açıken bol su ile yıkayınız. Doktora başvurulmalıdır.
İltih: Temas halinde elbiselerini çıkarınız. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayınız. Doktora başvurulmalıdır.
Yutma: Yutulması durumunda derhal doktora başvurun. İlacın mideden tahliyesine doktor karar vermelidir.
Soluma: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

®HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.'nin tescilli markasıdır.

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER:
Clopyralid

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P273 Çevreye verilmesinden kaçınız.
P280 Korumaya eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.
P501 İçerdiği/kabı ulusal yönetmelikler doğrultusunda bertaraf ediniz.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı uygulamayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınız.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörür (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılma kaydı ile, İmalatçılar bitki koruma ürününün kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

23 Şubat 2026



KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra kanıtıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaları yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Buğday: Buğdayın kardeşlenme döneminde, koker otun 2-4 yapraklı döneminde devresinde kullanılır.

Şekerpancarı: Şekerpancarı ve köygöçüren çıktıktan sonra kullanılır. En etkili sonuç köygöçürenin 2-4 yapraklı döneminden, boyu 15-20 cm oluncaya kadar olan devrede yapılan tatbikatlardan alınır.

Kanola: Kanola ve yabancı otlar çıktıktan sonra, yabancı otların erken gelişme döneminde (2-6 yaprak) kullanılması tavsiye edilir.

Soğan: Soğan ve köygöçüren çıktıktan sonra, köygöçürenin 2-4 yapraklı devresinde kullanılması tavsiye edilir.

İspanak: İspanak ve yabancı otlar çıktıktan sonra, yabancı otların 2-4 yapraklı devresinde kullanılması tavsiye edilir.

PHAETON® 100 hakkında bir şikâyetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

Phaeton® 100 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O,4 olarak sınıflandırılan bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Phaeton® 100**'ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O,4 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

**HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.****PHAETON® 100****Suda Çözünen Konsantre (SL)**

Grubu	O,4	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	-----	-----------------------------

100 g/l Clopyralid

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:
HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.
Gebze OSB Mahallesi 700. Sk.
No: 711/1 41400 Gebze / KOCAELİ
Tel: 0262 751 14 12
Fax: 0262 751 14 22



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

23 Subat 2026



Rev.2