

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve Numarası: **06.03.2023/12684**

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Ayçiçeği	Farekulağı (<i>Anagallis arvensis</i>) Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Kırmızı çiçekli balıbbaba (<i>Lamium purpureum</i>) Çobandeğneği (<i>Polygonum aviculare</i>) Yabani turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Kuş otu (<i>Stellaria media</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Yabani fiğ (<i>Vicia spp.</i>)	300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi
Havuç	Horoz İbiği (<i>Amaranthus spp.</i>) Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Çobandeğneği (<i>Polygonum aviculare</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Yabani turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>)	250 ml/da Ekimden hemen sonra havuç toprak yüzüne çıkmadan önce
Patates	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Yeşil horozibiği (<i>Amaranthus viridis</i>) Çoban çantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Hakiki şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>)	200-250 ml/da Hafif topraklarda düşük, ağır topraklarda yüksek doz kullanılır. Dikimden sonra en geç 5 gün içinde uygulanmalıdır.
Nohut	Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Yabk sirken (<i>Chenopodium vulvaria</i>) Dikenli yabani marul (<i>Lactuca serriola</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	250 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi
Mercimek	Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Dil kanatan (<i>Galium aparine</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Arap baklası (<i>Vaccaria pyramidata</i>) Kaba fiğ (<i>Vicia narbonensis</i>)	250 ml/da Ekim sonrası, çıkış öncesi

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu suya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

LUENA® 250 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	F1	Herbisit (Yabancı Ot ilacı)
-------	----	-----------------------------

250 g/L Flurochloridone

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Gözlerde ve deride tahriş, ateş.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz ile temas halinde Gözleri tedbir amaçlı suyla yıkayın.

Cilt ile temas halinde Cildinizi su/duş ile durulayın. Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkarın. Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

Yutulması halinde Ağzı çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın.

Solunması halinde Kişiyi temiz havaya çıkartın ve rahat nefes almasını sağlayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

© **HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.**'nin tescilli markasıdır.

Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) Tel: 114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

02 Şubat 2023



Net Miktar:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

Flurochloridone
Ksilen
Sikloheksanon

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H302+H312+H332 Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H360 Doğmamış çocukta hasara yol açabilir veya üremeye zarar verebilir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmez.
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.
P501 İçeriği/kabı; yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun olarak, zararlı veya özel atık toplama noktasında bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anlara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıkla zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Soğan, Domates, Tütün, Kabakgiller (Kabak, Hiyar, Karpuz ve Kavun) ve Lahanağiller (Lahana, Karnabahar ve Turp) ilaca karşı çok hassas olduklarından Luena® 250 EC kullanılan tarlaya 12 ay sonra ekilmelidir.

Özgür Koyuncu
Bitki Koruma Ürün Müdürü

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Luena® 250 EC, ayçiçeği ve havuçta ekimden hemen sonra (1-2 gün içerisinde), patatesten dikimden sonra en geç 5 gün içerisinde toprak yüzeyine, mercimek ekiminden sonra mercimek ve yabancı otlar toprak yüzeyine çıkmadan önce uygulanmalıdır. **Luena® 250 EC**'den en yüksek etkiyi almak için, ekimden veya dikimden önce toprak keseksiz olarak hazırlanmalıdır. **Luena® 250 EC** çıkmış yabancı otlara etkili olmadığından uygulama sırasında tarlada çıkmış yabancı ot bulunmamalıdır. **Luena® 250 EC** uygulandıktan sonra uygulama yapılmış tabakanın bozulmaması için, zorunlu olmadıkça toprak işlenmemelidir. Patatesten geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış öncesi olarak, hafif topraklarda düşük (200 ml/da), ağır topraklarda yüksek doz (250 ml/da) kullanılmalıdır. Uygulama yelpaze şeklinde püskürtme yapan (tee-jet) meme ile 2.0-2.5 bar basınçla yapılmalıdır. Uygulama rüzgârsız havada yapılır. Uygulama yapılırken aynı yerden üst üste geçilmemelidir. Havuç tohumlarının çimlenmesi için sulama gerekli ise, uygulamadan hemen sonra yağmurlama sulama yapılmalıdır.

Luena® 250 EC hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

LUENA® 250 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **LUENA® 250 EC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması önerilmez.

**HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.****LUENA® 250 EC****Emülsiyon Konsantre (EC)**

Grubu	F1	Herbisit (Yabancı Ot ilacı)
-------	----	-----------------------------

250 g/L Flurochloridone**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Gebze OSB Mahallesi 700. Sk. No: 711/1

41400 Gebze / KOCAELİ

Tel: 0262 751 14 12

Fax: 0262 751 14 22



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

02 Şubat 2023

[Signature]

[Signature]
Özgür Koyuncu
Bitki Koruma Ürün Müdürü