

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 22.12.2022/12613

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu
Bağ	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	400 ml/100 L su
Domates (Sera)	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	400 ml/100 L su
Domates (Tarla)	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	400 ml/da
Hıyar (Sera)	Kabakgillerde mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	400 ml/100 L su
Marul (Sera)	Mildiyö (<i>Bremia lactucae</i>)	400 ml/100 L su
Turuncgiller	Turuncgill meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması (<i>Phytophthora citrophthora</i>)	1000 ml/100 L su
Patates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	400 ml/100 L su
Ispanak (Tarla)	Ispanak mildiyüsü (<i>Peronospora farinosa</i>)	400 ml/da
Nar	Kök ve kök boğazı çürüklüğü (<i>Phytophthora spp.</i>)	400 ml/100 L su
Muz (Sera)	Fusarium kök çürüklüğü hastalığı (<i>Fusarium oxysporum</i>)	400 ml/100 L su
Çilek (Sera)	Kök çürüklüğü hastalığı (<i>Fusarium oxysporum</i> , <i>Macrophomina phaseolina</i> , <i>Pythium sp.</i>)	2000 ml/da (damla sulama ile)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

Damla Sulama Uygulaması: Damlama sisteminin kalibrasyonu için baştan ve sondan 3 meme 10 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma %10'u geçmemelidir. Dekara verilecek bitki koruma ürünü için gerekli su miktarı belirlenir.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Damla sulama sistemi ile çilekte kök çürüklüğü hastalığı için ilaçlama normu 500 L/da olmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

09 Şubat 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.

TELEDE®

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	P07	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	-----	-------------------------

400 g/L Phosphorous Acid (mono ve di-potasyum tuzları)

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya kuruduktan sonra insan ve hayvan girmesinde sınırlama yoktur.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Göz ile teması halinde: 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

Deri ile teması halinde: Elbiseleri çıkarın. Bitki koruma ürünü değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

Solunması halinde: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Gerekli görülmesi halinde suni teneffüs yaptırın. Doktora başvurulmalıdır.

Yutulması halinde: Ağız bol suyla yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Doktor tarafından söylenmedikçe kusturulmamalıdır. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

® HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.'nin tescilli markasıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114



Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Miktarı:

İÇİNDEKİLER:

Phosphorous Acid (mono ve di-potasyum tuzları)

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ:

P264 Elleçlemeden sonra su ve sabun ile iyice yıkayın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürününü ağzı kapalı çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışından bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.



Rev.4

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

TELEDE® kullanım zamanı çok önemlidir. **TELEDE®** uygulaması için mildiyöye yönelik tahmin ve uyarılar dikkate alınmalı veya hastalık riskini arttıran iklim koşulları oluşmaya başladığında uygulamaya geçilmelidir.

Bağda mildiyöye karşı ilk uygulamaya sürgünler 25-30 cm'ye ulaşınca başlanmalıdır. 2. ve sonraki uygulamalar 1. uygulamanın etki süresi, hastalığın gelişme durumu ve meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile yapılır.

Domateste mildiyöye karşı uygulamaya hastalığın her yıl görüldüğü ve zarar yaptığı üretim alanlarında hastalık belirtileri görülmeden, günlük ortalama sıcaklığın 16°C ve orantılı nemin en az %80 olması halinde başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmeyen alanlarda ise uygulamaya çevrede ya da tarlada hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.

Hıyarda (sera) mildiyöye karşı uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkilerin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Marulda (sera) mildiyöye karşı fideciklerde hastalık görülmeden koruyucu bir uygulama yapılmalıdır. Mildiyö görülürse hasta kısımlar toplanıp yok edildikten sonra birer hafta aralıklarla fidecilerin şaşırtılmasına kadar uygulamalar sürdürülmelidir. Şaşırtıldıktan sonra hastalığın çevrede görülmesi ile uygulamaya başlanmalı ve birer hafta aralıklarla devam edilmelidir. Uygulama sulama yapıldıktan ve yapraklar kuruduktan sonra yapılmalıdır. Yaprakların alt ve üstlerinin ürün ile iyice kaplanmasına özen gösterilmelidir.

Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanmasına karşı:
Meyve enfeksiyonlarına karşı:

1. uygulama: Sonbaharda yağışlar başlamadan önce yapılmalıdır.
2. uygulama: Havalar yağışlı giderse 1. uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

Gövde ve kökboğazı enfeksiyonlarına karşı: Gövde ve kök enfeksiyonlarında bir uygulama yapılır. Yara yerindeki kabuk temiz bir bıçak ile tamamen temizlenmeli ve özellikle ağaç tacının 1-1,5 metre yüksekliğe kadar olan kısımları iyice ilaçlanmalıdır.

Patateste mildiyöye karşı mildiyönün her yıl görüldüğü ve büyük zarar yaptığı üretim alanlarında hastalık belirtileri görülmeden, günlük ortalama sıcaklığın 16°C veya en düşük sıcaklığın 10°C'yi bulması ile uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmeyen alanlarda ise uygulamaya başlamak için çevrede ya da tarlada ilk hastalık belirtilerinin görülmesi beklenmelidir.

İspanakta mildiyöye karşı 1. uygulama hastalık koşullarının oluşmaya başladığı ve çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. 2. ve 3. uygulama bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Narda kök ve kök boğazı çürüklüğüne karşı uygulama koruyucu olarak dikimle birlikte yapılır. Hastalığın görüldüğü bahçelerde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanır ve hızlı sürgün gelişim dönemlerinde (İlkbahar, yaz, sonbahar) devam edilir. Toprak üstü uygulamalarında ağacın tümü kaplanacak şekilde rüzgarsız havada uygulama yapılmalıdır.

Muzda fusarium kök çürüklüğü hastalığına karşı ilaçlama koruyucu olarak dikimle birlikte, ayrıca tekrar toprak ilaçlaması şeklinde yapılır. Uygulamaya dikim esnasında ve/veya muzun erken gelişim döneminde başlanmalı 10 gün aralıklarla 3 ilaçlama yapılır.

Çilek (sera) kök çürüklüğü hastalığına karşı çilek fideleri seraya şaşırtıldıktan sonra, damlama sulama sistemi ile tavsiye edilen dozda bitki koruma ürünü sulama suyu ile toprağa verilir. Buna göre:

1. Uygulama: Fidler seraya şaşırtıldıktan sonra hemen yapılmalıdır.
2. Uygulama: Birinci uygulamadan 10 gün sonra yapılır. Uygulamalara gerekirse 10 gün aralıklarla devam edilmelidir.

TELEDE® hakkında bir şikâyetiniz olması halinde **İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne** bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

TELEDE® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup P07 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **TELEDE®**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup P07 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.

09 Şubat 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.



HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.

TELEDE®

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	P07	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	-----	-------------------------

400 g/L Phosphorous Acid (mono ve di-potasyum tuzları)

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.
Gebze Osb Mahallesi 700. Sk. No: 711/1
41400 Gebze / KOCAELİ
Tel: 0262 751 14 12
Fax: 0262 751 14 22

