

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No.su: 09.07.1998 / 3443

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Tütün (Amerikan tipi tütünlerde)	375 ml/10 L suya Yan dallanmayı engellemek amacıyla (koltuk sürgünlerini kontrol için)	-

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

ROYALTAC® yan dallanmayı engelleyen, değme etkili bir bitki gelişim düzenleyicidir. Değme etkili olduğu için bitki saplarının tüm kısımlarına uygulama yapılması gereklidir ve kontrol için tüm küçük gelişen yan dallanmalara temas etmelidir. **ROYALTAC®** tüm tütün varyetelerinin yetiştirilmesinde yan dallanma kontrolünde kullanılabilir. **ROYALTAC®** tepe kırımından sonra ve önce uygulanabilir, tercihen rozetlenmeden sonra ve çiçekler açmaya başlamadan önce uygulanmalıdır. Kırımından sonraki hafta içinde **ROYALTAC®** uygulamasıyla en iyi sonuçlar alınmıştır. Tütünde ilk defa kırım yapıldıyorsa kırımından sonra 2 gün içinde uygulama yapılır, kırım sırasında 2.5 cm'den büyük yan dallanmalar elle ortadan kaldırılmalıdır. Uygulamalar tepe almanın ardından tepeden dökme yöntemiyle yapılır. Her bitkiye 20 ml hazırlanan karışım kullanılır. İlk uygulamadan 5 gün sonra ikinci uygulama yapılır.

- Şark tütünleri dışındaki tütünlere kullanınız.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır.



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

ROYALTAC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grup	-	Bitki Gelişi Düzenleyicisi
------	---	----------------------------

679 g/l n-decanol

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz ile teması halinde: En az 15 dakika göz kapaklarının içi de dâhil derhal bol su ile yıkayın. Tıbbi bakım alın.

Deri ile teması halinde: Kirilenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarın. Sıcak su ve sabun ile yıkayın. Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

Solunması halinde: Temiz havaya çıkartın. Tıbbi bakım alın.

Yutulması halinde: Kusturmayın. Ağız suyla çalkalayın. Tıbbi bakım alın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114



Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı: Baskı

İÇİNDEKİLER:
n-decanol

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H315 Cilt tahrişine yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.
P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanınız.
P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf ediniz.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Boş ürün ambalajlarını başka amaçlarla kullanmayınız ve usulüne uygun imha ediniz.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.



19 Temmuz 2023
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

39 Zuh.

Rev.1



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

ROYALTAC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grup	-	Bitki Gelişi Düzenleyicisi
------	---	----------------------------

679 g/l n-decanol

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİCİ FİRMA ve FABRİKA ADRESİ:

Arysta LifeScience S.A.S.
Located BP 80, Route d'Artix,
64450 Nogueres,FRANSA

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

HEKTAŞ TİCARET T. A.Ş.
Gebze Osb Mahallesi 700. Sk. No: 711/1
41400 Gebze / KOCAELİ
Tel: 0262 751 14 12
Fax: 0262 751 14 22

19 Temmuz 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

BG

Bah



Rev.1