

TANCAN
DOMARK® 10 EC

Emülsiyon konsantre (EC)

| | | |
|-------|-------|----------------------------|
| GRUBU | G1, 3 | Fungisit (Mantar ilacı) |
|-------|-------|----------------------------|

100 gr / L Tetraconazole

Önce etiketi okuyunuz

Evde kullanmayınız

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey

yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya bağda 15 gün, kabakgıl ve

tütün tarlasına 7 gün, domates ve hyar tarlasına 3 gün insan ve

hayvan sokmayınız

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği

şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI

KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajların ¼'üne kadar

temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama

tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım

isteyin (mümkünse etiketi gösterin).

Solunum: Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Ağzı ve

burnu iyice yıkayın. Kazazede bayılmış ise eğitilmiş kişi tarafından suni

solunum yapılabilir. Mümkünse oksijen verin. Herhangi bir

rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

Yutma: Kusturmayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle

sıvı bir şey vermeyin. Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka

bir yere götürün. Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir

rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

Ciltle Temas: Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi bol suyla iyice yıkayın.

Yıkadıktan sonra tahrişin gıysileri çıkarın. Cildi bol suyla iyice yıkayın.

Gözlerle Temas: Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce

çıkarmalısınız. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla

yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra


belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır

UZEM Ulusal Zehir Merkezi Tel: 114

® Isagro S.p.A'nın tescilli markası



Net Miktar:

Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER

Tetraconazole

Çözücü nafta

ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H302 Yutulması halinde zararlıdır

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür

H315 Cilt tahrişine yol açar

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar

H336 Rehavete veya baş dönmesince yol açabilir

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın

P273 Çevreye verilmesinden kaçının

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P331 Kusturmayın

P391 Döküntüleri toplayın

P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma

talimatlarına uyun

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

· Çiçeklenme zamanı kullanmayın

· Arılara zehirlidir

· Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.

· Tavsiye edilen bitkilerde ve uygun dozda kullanıldığında fitotoksik etki

görülmaz.

· İlaç ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

· Boş kapları usulüne uygun olarak imha ediniz. Başka amaçlar için kullanmayınız.

· Ateş, kıvılcım ve aşırı ısıcaktan koruyunuz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4

yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerde hoşgörü (tolerans)

sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçı ürünün kalitesini garanti eder.

İmalatçı ilacın hatalı depolanması, hatalı tatbiki ve tavsiyeler dışındaki

kullanımından dolayı sorumlu değildir. Dört yıl süre ile spesifikasyona

uygunluğunu garanti eder.

ÜRETİCİ FİRMA: ISAGRO S.p.A. Caldera Business Park, Via Caldera 21,

20153 Milano - İTALYA

ÜRETİM TESİSİ: ISAGRO S.p.A. Via Nettunense km 23,400 04011 Aprilia

(LT) İTALYA

RUHSAT SAHİBİ: TANCAN Dış Ticaret Limited Şirketi

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Eston Çamlı Evler Sitesi Sahil Çarşı

Blok No:43C İç Kapı No:51 34752 Ataşehir İSTANBUL TEL: +90 216 469 01 90

TANCAN Dış Ticaret Ltd. Şti.

Karaman Çiftlik Mah. Eston Blokları

Sahil Çarşı Blok No:14 Daire:51

İçerenköy Mah. Ataşehir İstanbul TURKEY

İletişim: +90 216 469 01 90

Koşulları V.D.: 819 010 7142

Dr. Can Atilla

İmal Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Şarj No:

Ruhsat Tarih ve Numarası: 4 Nisan 2002 - 4110

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu | Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre | |
|-----------------|----------------------------|--|--|--------|
| Bağ* | Külleme | <i>Erysiphe necator</i> | 30 ml/100 l su | 14 gün |
| Çilek | Külleme | <i>Sphaerotheca macularis f. sp. fragariae</i> | 50 ml/100 l su | 3 gün |
| Domates | Patlıcangillerde e külleme | <i>Leveillula taurica</i> | 50 ml/100 l su | 3 gün |
| Fındık | Külleme | <i>Erysiphe spp.</i> | 50 ml/100 l su | 21 gün |
| Hyar | Kabakgillerde Külleme | <i>Erysiphe cichoracearum</i> | 50 ml/100 l su | 7 gün |
| Hyar (Sera) | Külleme | <i>Erysiphe cichoracearum</i> | 50 ml/100 l su | 3 gün |
| Kornişon | Külleme | <i>Erysiphe cichoracearum</i> | 50 ml/100 l su | 7 gün |
| Kornişon (Sera) | Külleme | <i>Erysiphe cichoracearum</i> | 50 ml/100 l su | 3 gün |
| Şeftali | Külleme | <i>Sphaerotheca pamosa var. persicae</i> | 40 ml/100 l su | 14 gün |
| Tütün | Külleme | <i>Erysiphe cichoracearum</i> | 40 ml/100 l su | 7 gün |

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmıaz

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalışır durumaıyken ilaçlı su depoya verilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanuncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanınız.

Kalibrasyon: Uygulama alanında uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli anca verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamaların günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Uygulama Makinesinin Temizliği: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarını yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ Küllemesi:

1.uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde

2.uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının olduğu dönemde

3.uygulama: Çiçek taç yapraklarının döktüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde

4. ve diğer uygulama: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşünme dönemine kadar yapılır

Çilek Küllemesi:

1.uygulama: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır

2. ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları sona erinceye kadar uygulamalara devam edilir

Patlıcangillerde Külleme (Domates):

Uygulamalar ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır

Fındık Küllemesi:

Hastalık bahçede ilk defa çıkarsa, belirtiler görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. *P. guttae*'nin neden olduğu

külleme hastalığı bahçede daha önceki yıllarda görülmüş ise belirtiler görülmeden önce yapraklar normal

büyükliğini aldıktan sonra ilk ilaçlama yapılmalıdır. *Erysiphe sp.*'nin neden olduğu külleme hastalığı bahçede

daha önceki yıllarda görülmüş ise meyve (çotanak) bağlama döneminde ilaçlamaya başlanır. İler iki hastalık etmeni

için hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etki süresi dikkate alınarak ikinci ve diğer ilaçlamalara hasada kadar

devam edilir. Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
30 Kasım 2021

Kabakgillerde Külleme

Hiyar :

İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulama devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C'nin üstünde ve orantılı neminde % 50'nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Kornişon:

İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulama devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C'nin üstünde ve orantılı neminde % 50'nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Şeftali Küllemesi:

1. uygulama: Önceki yıllardaki hastalığın yoğunluğuna göre belirlenmelidir. Hastalık bahçede ilk defa çıkıyorsa belirtiler görülür görülmez uygulamaya başlanmalıdır. Daha önceki yıllarda hastalık görülüş ise budamadan sonra yapılacak kontrollerde ağaçlardaki hastalıklı sürgün oranı %3'ü buluyorsa belirtiler görülmeden önce (yani önceki yıllarda hastalığın görüldüğü tarihten en az 5-8 gün önce veya sürgünler 20 cm olunca) ilk uygulama yapılmalıdır.

2. ve diğer uygulamalar: Bitkinin gelişmesine kullanılan preparatın etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar 14 gün arayla uygulamaya devam edilir.

Tütün Küllemesi:

Uygulama yaprağın alt ve üst yüzünde ince bir film tabakası oluşturacak şekilde yapılmalıdır. İlk külleme lekeleri görülür görülmez uygulamalara başlanır. Tek uygulama yeterli olabilir. Epidemi devam ederse 2. ve 3. uygulama 7-10 gün ara ile yenilenir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

DOMARK 10 EC adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre grup G1, 3 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için DOMARK 10 EC'nin aynı sezon içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup G1, 3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIĞI:

DOMARK 10 EC karışım halinde kullanılacaksa küçük hacimli bir ön karışım yapılmalıdır.

TANCAN DOMARK® 10 EC

Emülsiyon konsantre (EC)

| | | |
|-------|-------|----------------------------|
| GRUBU | G1, 3 | Fungisit (Mantar ilacı) |
|-------|-------|----------------------------|

100 gr / L Tetraconazole

Net Miktarı:

Azami Perakende Satış Fiyatı:

TANCAN Tarım Ürünleri Ltd. Şti.

Karaman Çiftliği Ziraatçılık Blokları

Sahil Camii Blok No: 14 Daire 51

İçerenköy, 47200 Çarşamba / Karaman / TÜRKİYE

Tel.: +90 346 469 01 90

Kayıtlı V.D.: 819 010 7142

Dr. Can Atilla

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı



30 Kasım 2021
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.