

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj No:

Ruhsat Tarih ve No.su: 21.09.2004 / 4829

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:**

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Bağ *	Köpekdişi ayrığı Kanyaş	( <i>Cynodon dactylon</i> ) ( <i>Sorghum halepense</i> ) <b>100 ml/da</b> Köpekdişi ayrığı 15-20 cm, kanyaş 2-3 kardeşle iken
Domates	Köpekdişi ayrığı Darıcan Kanyaş	( <i>Cynodon dactylon</i> ) ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) ( <i>Sorghum halepense</i> ) <b>100 ml/da</b> Domatesler 15-20 cm boyda, yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde, Çıkış sonrası
Ayçiçeği	Tilkikuyruğu Brom Köpekdişi ayrığı Darıcan Yabani arpa Yabani darı Çayır püskülü Yapışkan darı Kanyaş	( <i>Alopecurus myosuroides</i> ) ( <i>Bromus spp.</i> ) ( <i>Cynodon dactylon</i> ) ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) ( <i>Hordeum spontaneum</i> ) ( <i>Panicum spp.</i> ) ( <i>Poa spp.</i> ) ( <i>Setaria spp.</i> ) ( <i>Sorghum halepense</i> ) <b>100 ml/da</b> Ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış sonrası
Soğan	Darıcan Yapışkan darı Kanyaş	( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) ( <i>Setaria spp.</i> ) ( <i>Sorghum halepense</i> ) <b>100 ml/da</b> Soğan 15-20 cm boyunda, kanyaş 3-5 yapraklı, darıcan ve yapışkan darı 10-15 cm boyunda iken
Kırmızı mercimek	Tilkikuyruğu Kısır yabancı yulaf Kendi gelen arpa Kendi gelen buğday	( <i>Alopecurus myosuroides</i> ) ( <i>Avena sterilis</i> ) ( <i>Hordeum vulgare</i> ) ( <i>Triticum aestivum</i> ) <b>75 ml/da</b> Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde Çıkış sonrası
	Ayrık	( <i>Elymus repens</i> ) <b>100 ml/da</b> Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde Çıkış sonrası
Şekerpancarı	Tilkikuyruğu Yabani yulaf Püsküllü çayır Darıcan,	( <i>Alopecurus myosuroides</i> ) ( <i>Avena fatua</i> ) ( <i>Bromus tectorum</i> ) ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) <b>75-100 ml/da</b> Yıllık yabancı otlarda düşük, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.
Pamuk	Kanyaş	( <i>Sorghum halepense</i> ) <b>75-100 ml/da</b> Tohumdan gelenlerde düşük, rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır.
Soya fasulyesi	Tilkikuyruğu Köpekdişi ayrığı Darıcan Kuşyemi Yabani darı Kanyaş	( <i>Alopecurus myosuroides</i> ) ( <i>Cynodon dactylon</i> ) ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) ( <i>Phalaris spp.</i> ) ( <i>Panicum spp.</i> ) ( <i>Sorghum halepense</i> ) <b>100 ml/da</b> Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu devrede Çıkış sonrası
Kanola	Delice	( <i>Lolium temulentum</i> ) <b>200 ml/da</b> Çıkış sonrası
	Tilkikuyruğu Kısır yabancı yulaf Köpekdişi ayrığı Kuşyemi Çayır püskülü Yapışkan darı Kendi gelen buğday	( <i>Alopecurus myosuroides</i> ) ( <i>Avena sterilis</i> ) ( <i>Cynodon dactylon</i> ) ( <i>Phalaris spp.</i> ) ( <i>Poa spp.</i> ) ( <i>Setaria spp.</i> ) ( <i>Triticum aestivum</i> ) <b>100 ml/da</b> Çıkış sonrası
Nohut	Tilkikuyruğu Yabani yulaf Kendi gelen buğday	( <i>Alopecurus myosuroides</i> ) ( <i>Avena fatua</i> ) ( <i>Triticum aestivum</i> ) <b>75 ml/da</b> Çıkış sonrası

\* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.



**HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.**

**FORMULA SUPER® 5 EC**

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	A,1	Herbisit (Yabancı ot İlacı)
-------	-----	-----------------------------

**50 g/l Quizalofop-p-ethyl**

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulanık görme görülebilir.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**

**Göz:** Temas halinde 15-20 dakika göz açkiken bol su ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.  
**Cilt:** Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurun.

**Yutma:** Doktor tarafından aksi söylenmedikçe kusturmaya çalışmayın. Zehir danışma merkezini arayın veya doktora başvurun. Bilinci kapalı hastaya ağızdan hiçbir şey vermeyin ve kusturmaya çalışmayın.


**Solunum:** Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Solunum yavaşlamışsa suni solunum yaptırın. Derhal doktora başvurulmalıdır.

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:**

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114**

® HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.'nin tescilli markasıdır.



Net Miktarı:  
Azami Per. Sat. Fiyatı:

**İÇİNDEKİLER:** Quizalofop-p-ethyl  
Aromatik hidrokarbon

**ZARARLILIK İŞARETLERİ:**



DİKKAT

**ZARARLILIK İFADELERİ (H):**

H226 Alevlenir sıvı ve buhar  
H312 Cilt ile temas halinde zararlıdır.  
H315 Cilt tahrişine yol açar.  
H332 Solunması halinde zararlıdır.  
H413 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.

**ÖNLEM İFADELERİ (P):**

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.  
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/ spreyini solumaktan kaçınınız.  
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.  
P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.  
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.  
P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.  
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı uygulamayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Boş ürün ambalajlarını başka amaçlarla kullanmayınız ve imha ediniz.
- Depoda başka bitki koruma ürünleri ile karışmasına mani olunuz.
- İlacın hazırlanmasında temiz su kullanınız.
- Tohumlarla temas ettirmeyiniz.
- Buğdaygillere karşı fitotoksiktir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.  
03 Şubat 2021



Rev.2

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**KALİBRASYON:**

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

**İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:**

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**

Bitki koruma ürünü yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu ve hızlı bir gelişme gösterdikleri genç dönemlerinde (Kanyaş için bu dönem yabancı otların 30 cm oldukları dönemdir.) yabancı otların üzerine püskürtülmek sureti ile kullanılır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Yabancı otların gelişimlerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.

**DİRENÇ YÖNETİMİ:**

**FORMULA SUPER® 5 EC** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A,1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **FORMULA SUPER® 5 EC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A,1 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:** Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

**HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.****FORMULA SUPER® 5 EC**

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	A,1	Herbisit (Yabancı ot İlacı)
-------	-----	-----------------------------

**50 g/l Quizalofop-p-ethyl**

**DEPOLAMA DURUMU:** Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:** Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

**RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:**  
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.  
Gebze OSB Mahallesi 700. Sk. No: 711/1  
41400 Gebze / KOCAELİ  
Tel: (0262) 751 14 12  
Fax: (0262) 751 14 22



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR  
03 Şubat 2021

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN  
Daire Başkan V.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.  
GEBZE  
Özgür KOYUNCU  
Bitki Koruma Ürün Müdürü  
OSB Mh. 700. Sk. No: 711/1