

İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi. (")
Şarj No: (Damga ile)
Ruhsat tarih ve no.su :

Kullanıldığı Bitki ve Yabancıotlar

Bitki Adı	Yabancıot adı	Kullanma Dozu	Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
Pamuk	Kanyaş-Geliç (<i>Sorghum halepense</i>)	60 ml/da	15 gün
Soya	Kanyaş-Geliç (<i>Sorghum halepense</i>)	60 ml/da	15 gün
Narenciye	Köpek dişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>)	240 ml/da	15 gün
	Kanyaş-Geliç (<i>Sorghum halepense</i>)	60 ml/da	15 gün
Mercimek	Yabani yulaf (<i>Avena fatua</i>)	45 ml/da	15 gün
Domates	Kanyaş-Geliç (<i>Sorghum halepense</i>)	60 ml/da	52 gün
Biber	Kanyaş-Geliç (<i>Sorghum halepense</i>)	60 ml/da	52 gün
Bağ	Köpek dişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>)	240 ml/da	52 gün
	Kanyaş-Geliç (<i>Sorghum halepense</i>)	60 ml/da	52 gün
Yerfıstığı	Kanyaş-Geliç (<i>Sorghum halepense</i>)	60 ml/da	98 gün
Karpuz	Kanyaş-Geliç (<i>Sorghum halepense</i>)	60 ml/da	52 gün
Soğan	Yabani yulaf (<i>Avena fatua</i>)	45 ml/da	52 gün
Şekerpancarı	Yabani yulaf (<i>Avena fatua</i>)	60 ml/da	56 gün
	Darıcan (<i>Echinochloa cruss-galli</i>)	60 ml/da	56 gün
	Tilki kuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>)	60 ml/da	56 gün
	Kuş yemi (<i>Phalaris paradoxa</i>)	60 ml/da	56 gün
	Buy (<i>Poa annua</i>)	60 ml/da	56 gün
	Delice (<i>Lolium sp.</i>)	60 ml/da	56 gün
	Ayrık (<i>Agropyron sp.</i>)	60 ml/da	56 gün

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç bir miktar su ile ayrı bir kaptan önce karıştırılarak depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir ve karıştırılır. İlaçlama sırasında mütecanis bir emülsiyon elde etmek için aletin çalıştırıcısı daima çalışır durumda olmalıdır.

TAKİMSAN TARIM KİMYA/ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HERALD® SUPER

HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)

Emülsiyon Konsantre

Litrede 108 gr. Haloxyfop -p - methyl:R-methyl-2-(4-(3-chloro-5-trifluoromethyl -2-pyridylox) phenoxy) propionate

Grup	A1	Herbisit
------	----	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ
EVDE KULLANMAYINIZ
ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ
İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ
SİGARA İÇMEYİNİZ
DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ
İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜREYE UYUNUZ.
İLAÇLANMIŞ SAHAYA 15 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı,baş dönmesi,halsizlik, bulantı ve görmede bulanıklık yapar.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Doktor çağırın, ilaç ambalaj veya etiketini birlikte götürün. Hastayı ilaçlama sahasından derhal uzaklaştırın. İlaça bulaşık elbiselerini derhal çıkarın. İlaç ile temas eden kısımlar bol su ve sabun ile yıkayın.Göze bulaşması halinde asgari 15 dakika temiz su ile gözleri yıkayın. Hasta soluk almakta zorluk çekiyorsa suni teneffüs yaptırın.Hastayı başı yana dönük olarak yatırın ve sıcak tutun.

ANTİDOTU: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

® TAKİMSAN TARIM KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN TESCİLLİ MARKASIDIR.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

13 Mart 2013

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Net Miktarı (kg veya lt)
Brüt ağırlık (kg)
Azami perakende satış fiyatı: Baskı
T.B. Yazısının Tarih ve No.su:
Basılı şerit (imal tarihi ve şarj
no.su ile birlikte)

TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

Xi: Tahrış edici, N:Çevre için Tehlikeli

TEHLİKE SEMBOLLERİ:



Xi: Tahrış edici N: Çevre için tehlikeli

İÇİNDEKİLER:

Haloxyfop-p-methyl

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:

R36 : Gözleri tahrış eder.
R51/53 : Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:

S2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S26 : Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun
S35 : Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.
S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
S57 : Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın



KULLANMA ŞEKLİ: Emülsiyon konsantre olan ilaç suyla hemen karıştırıldığından her türlü aletle kullanılır. Kesin sonuç almak için dozunun tavsiyelere uygun olarak kullanılmasıdır.
Herald Süper ile en iyi ve kesin sonuç yabancıotların 15-20 cm boyunda ,5-6 yapraklı dev-resinde kullanıldığında alınır. İlk tatbikattan 20-25 gün sonra aynı dozda yapılan 2. tatbikatta tarlada yeni çimlenen yabancıotlar kontrol edilir. Köpek dişi ayrığı için tek tatbikat yeterlidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: **Herald Süper** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Herald Süper**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: **Herald Süper** şeker pancarında yabancıot mücadelesinde kullanılan Clopyralid aktif maddeli ilaçlar ile karışır.

TAKİMSAN TARIM KİMYA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
HERALD® SUPER

HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
Emülsiyon Konsantre
Litrede 108 gr. Haloxyfop -p - methyl:R-methyl-2-
(4-(3-chloro-5-trifluoromethyl -2-pyridylox) phenoxy) propionate

Grup	A1	Herbisit
------	----	----------

EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir.
- Balıklara zehirlidir.
- Elbiselerinizi tekrar kullanmadan önce yıkayınız.
- İlaçlamadan sonra kullandığınız aleti iyice yıkayınız.
- İlaçlamadan sonra ve herhangi bir şey yiyip içmeden ve sigara kullanmadan önce ellerinizi ve ilaca maruz kalmış vücut kısımlarını yıkayınız.
- İlacı ambalajlarında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU :

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar müstahzarlarının hatalı depolanması veya hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

FİRMA ADI VE ADRESİ :

RUHSAT SAHİBİ:
TAKİMSAN TARIM KİMYA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsandede Cad. 700. Sok.
41480 Gebze/KOCAELİ
Tel : (0 262) 751 14 12 (7 hat)
Fax : (0 262) 751 14 22

İMALATÇISI VE YETKİLİ SATICISI:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsandede Cad. 700. Sokak
41480 Gebze/Kocaeli
Tel : (0262) 751 14 12 (7 hat)
Fax : (0262) 751 14 22

Dr. Neziha BENSİK
Genel Müdür (Farmasist)

JIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TARİHİ EDİLMİŞTİR

13 Mart 2013

Mehmet AĞAÇ VURUŞKAN
Yönetim Kurulu Üyesi