

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve Numarası:



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

LINETTI® 465 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu F2,27 Herbisit (Yabancıot ilacı)

225 g/L Isoxaflutole + 90 g/L Thiencabazone-methyl
150 g/L Cyprosulfamide (safener)

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz ile temasında: 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

Cilt ile temasında: Elbiseleri çıkarın. Bitki koruma ürünü değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

Solunması halinde: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Gerekli görülmesi halinde suni teneffüs yaptırın. Doktora başvurulmalıdır.

Yutulması halinde: Ağız bol suyla yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Doktor tarafından söylenmedikçe kusturulmamalıdır. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

® HEKTAŞ TİC. T.A.Ş.'nin tescilli markasıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Mısır	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Yapışkan ot (<i>Seteria verticillata</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>)	30 ml/da Mısırdaki çıkış sonrası (2-3 yaprak), yabancı otlarda çıkış sonrası (post-emergence)
	Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	35 ml/da Mısırdaki çıkış sonrası (2-3 yaprak), yabancı otlarda çıkış sonrası (post-emergence)
	İmam pamuğu (<i>Abutilon theoprasii</i>) Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Şeytan elması (<i>Portulaca oleracea</i>) Yapışkan ot (<i>Seteria verticillata</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>)	30 ml/da Mısır ve yabancıotların çıkış öncesi döneminde (pre-emergence)
	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	35 ml/da Mısır ve yabancıotların çıkış öncesi döneminde (pre-emergence)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı ve uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

Genel olarak toprak herbisitlerinin karakteristik özelliği olarak uygulama öncesi iyi bir toprak hazırlığı, yeterli toprak nemli ile birlikte uygulama sonrası yeterli yağışın (ya da yağmurlama sulama) olması bitki koruma ürününün etkisinin artması için istenilen koşullardır. Bu koşulların sağlanamaması, uygulama sonrası aşırı yağışlar veya aşırı sulama (ör: karık usulü sulama sulama) durumunda bitki koruma ürününün etkisinde istenilen sonuçlar alınamayabilir.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

15 Mart 2023

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Miktarı:

İÇİNDEKİLER:
Isoxaflutole
Thiencabazone-methyl
Cyprosulfamide

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni solumayın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanınız.
P405 Kilit altında saklayınız.
P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf ediniz.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boş ambalajları başka bir amaç için kullanmayınız, usulüne uygun imha ediniz.

Dikkat: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız!



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

LINETTI® 465 SC mısır bitkisinin ekiminden çıkış sonrası (2-3 yaprak) döneme kadar uygulanabilen toprak herbisididir. Mısırın 3 yapraklı döneminden sonra kullanılmalıdır. **LINETTI® 465 SC**'nin etkili maddelerinden Isoxaflutole hem yaprak hem de kökler tarafından ama daha çok kökler vasıtasıyla alınır ve yabancı ot bünyesinde hem floem hem de ksilemde taşınarak sistemik etki gösterir. Damlama sulama yapılan alanlarda sulama sisteminin iyi olmadığı durumlarda bitki koruma ürününün etkinliğinde düzensizliklere neden olabilir. Yeterli yağışın olmadığı ve kuraklık problemi yaşanan alanlarda bitki koruma ürününün uygulama sonrasında ilk 7-10 gün içerisinde gerekli toprak neminin sağlanması için yağmurlama sulama yapılması tavsiye edilmektedir.

Münavebe ürünlerinde dikkat edilecek hususlar:

LINETTI® 465 SC uygulanmış alanlara normal mısır hasadından hemen sonra pulluk ile derin toprak işleme (30-35 cm) yapılmak suretiyle;
-6 ay sonra marul (fide), soğan, buğday
Diğer ürünler için firmamıza danışınız.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

LINETTI® 465 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F2,27 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, **LINETTI® 465 SC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F2,27 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanımına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Organik fosforlu insektisitlerle karışmaz. Kullanılacaksa 15 gün arayla uygulanmalıdır. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

**HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.****LINETTI® 465 SC****Süspansiyon Konsantre (SC)**

Grubu	F2,27	Herbisit (Yabancıot ilacı)
-------	-------	----------------------------

**225 g/L Isoxaflutole + 90 g/L Thienkarbazone-methyl
150 g/L Cyprosulfamide (safener)****DEPOLAMA DURUMU:**


Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal a açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünü kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolera dışından bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİM TESİSİ

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze Osb Mahallesi 700. Sk. No: 711/1
Gebze / KOCAELİ
Tel: 0262 751 14 12
Fax: 0262 751 14 22



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

15 Mart 2023

