



EC FERTİLİZER

NPK GÜBRESİ (HARMANLANMIŞ)

SOL-U-GRO® 12-48-8+ ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİK:

	(% w / w)
Toplam Azot (N).....	12
Amonyak azotu %9,5	
Nitrat azotu %2,5	
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda çözünür fosfor pentaoksit P ₂ O ₅	48
Suda çözünür fosfor pentaoksit P ₂ O ₅	48
Suda çözünür potasyum oksit K ₂ O.....	8
Suda çözünür Bor (B).....	0,02
Suda çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA şelatlı	0,05
Suda çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA şelatlı	0,1
Suda çözünür Manganez (Mn) Tamamı EDTA şelatlı ...	0,05
Suda çözünür Molibden (Mo).....	0,001
Suda çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA şelatlı	0,05

Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Cu, Fe, Mn, Zn)..... 5-8

Klor (Cl) İçeriği 0.2

DİKKAT

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ. DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ. TOPRAK VE / VEYA YAPRAK ANALİZİ YAPTIRILARAK GÜBRE KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR.

Net ağırlığı: 1 Kg/ 2,27 Kg

Üretim Tarihi (Prod. Date) :
Son kullanma tarihi (Expiry date) :
Şarj numarası (Batch number) :
Parti seri/ Kod no. (Serial no.) :

İTHALATÇI FİRMA: HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsandede cad. 700.
Sok. 41480 GEBZE/ KOCAELİ
Tel : + 90-262-751 14 12 (Pbx)
Fax: + 90-262-751 14 22

ÜRETİCİ FİRMA:

Miller Chemical & Fertilizer LLC
P.O.Box. 333, 120 Radio Road, Hanover,
Pennsylvania 17331 U.S.A.

KULLANILMASTI: Genel olarak tavsiye edilen doz, dekara yapraktan uygulama dozu 200 – 400 gr veya 100 litre suya 100 – 200 gr dir. Yağmurlama ve damla sulama sistemlerinde kullanılır.

(Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız ve asla uygun doz oranlarını aşmayınız.)

ELMA, ARMUT, MUZ, SEFTALİ, ERİK, KAYISI, KİRAZ, TURUNÇGİLLER, İNCİR, CEVİZ, BADEM, ANTEP FISTIĞI, FINDIK, KESTANE, KİVİ: Büyüme dönemlerinin başında ve bitkinin besin desteğine ihtiyaç duyduğu zamanda dekara 200 gr. veya 100 lt.suya 100-200 gr. dozda uygulanır. Birçok insektisit ve fungusitle karıştırılarak atılabilir. Sezon boyunca 3 uygulama yapılabilir.

ÇİLEK: İlk meyve gözleri belirlediğinde dekara 200 gr. dozda uygulanır. 7-10 gün ara ile 3 veya daha fazla sayıda uygulanabilir.

BAĞ, AHUDUDU, BÖĞÜRTLEN: Büyüme dönemi başlangıcında veya ihtiyaç duyulduğunda dekara 200 gr. dozda uygulanır.



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş

Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi 700 Sokak 41480 Gebze KOCAELİ
Tel: 0262 751 1412 Faks: 0262 751 1422

Hasan DUMAN
Satınalma Müdüğü



Rev:2

www.hektas.com.tr



SOYA, YER FISTIĞI, ŞEKER PANCARI, TATLI PATATES: Yaprak teşekkülünün tamamlanmasından sonra dekara 200 gr. dozda uygulanır ve gerektiğinde 3 kez tekrarlanır.

PAMUK: (erken dönem) : Pamuk 25 cm. boyda iken dekara 100 gr. dozda iki kez, 40 cm. boya eriştiğinde de dekara 200 gr. dozda yine iki kez olmak üzere 4 uygulama yapılmalıdır. Uygulamalar arasında 7-10 gün süre bırakılır.
(gelişme dönemi) : ilk çiçekten sonra dekara 200 gr. dozda uygulanır. Bu uygulama bitkinin gelişme durumuna göre 1-4 kez daha tekrarlanır.

DOMATES, PATLICAN, BİBER, HIYAR, KABAK, KAVUN, KARPUZ: Bitki 3-4 haftalık olduğunda, dekara 200 gr. dozda uygulanır. En iyi sonucu almak için sezon boyunca 7-10 gün ara ile 5-7 uygulama yapılmalıdır.

PATATES: SOL-U-GRO Bitki gençken dekara 200 gr. dozda ilk uygulama yapılır ve 7-10 gün aralarla yumru teşekkülünün başladığı dönemden 30 gün sonrasına kadar birkaç kez tekrarlanır.

KEREVİZ, MARUL, BROKOLİ, LAHANA, KARNABAHAAR, BRÜKSEL LAHANASI, İSPANAK : 100 lt. suda 200 gr. SOL-U-GRO eritilerek yapılan karışım şaşırtılan bitkilere can suyu olarak verilir. Ayrıca şaşırtmadan 3 hafta sonra dekara 200 gr. dozda yapraktan uygulanmaya başlanır, 7-10 gün ara ile sezon boyunca 3-6 kez tekrarlanır.

HAVUÇ, MAYDANOZ, KUŞKONMAZ : Yapraklar oluşumunu tamamlayınca dekara 200-400 gr. dozda uygulanır. Bitkinin ve hava şartlarının durumuna göre gerekirse aynı dozda tekrarlanır.

FASULYE, BEZELYE, NOHUT, BAKLA, MERCİMEK, SOĞAN, SARIMSAK : Bitki 3-4 haftalık olduğunda, dekara 200 gr. dozda uygulamaya başlanır, gerektiğinde 7-10 gün ara ile tekrarlanır.

BUĞDAY, ARPA, ÇAVDAR, YULAF, PİRİNC, MISIR, AYÇİÇEĞİ, SORGUM : Kardeşlenme başlangıcında yabancı ot ilaçları ile birlikte dekara 200 gr. dozda yapraktan uygulanır. Ayrıca hububatta başakların %10' u görüldüğünde yapılacak ikinci uygulamanın etkisi çok fazladır.

DEPOLAMA DURUMU: Kuru bir yerde, kapalı ambalajında ve -10 - + 40 °C arasındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden, su kaynaklarından uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerlerde ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalıdır ve iyi bir havalanma sağlanmalıdır.

FİRMA BEYANI: Ürünün ambalajında verilmiş olan bilgiler analizi ile sınırlı olup, kullanımları ise kontrolümüz dışındadır. Bu sebepten dolayı satıcı, kullanımdan veya depolanmasından doğan herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Talimatımız dışındaki kullanımlar için ön deneme yapılması tavsiye edilir. Miller Chemical & Fertilizer LLC'nin yazılı izni olmadan değişik şekilde ambalajlanamaz ve paketlenemez.

TAŞIMA TALİMATI: Elle taşıma esnasında eldiven giyiniz. Deri ve göz temasından kaçınınız. Gübre ile temas eden vücut kısımlarını bol su ile yıkayınız.

- ✓ Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği, etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş

Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi 700 Sokak 41480 Gebze KOCAELİ
Tel: 0262 751 1412 Faks: 0262 751 1422



Rev:2

www.hektas.com.tr