

İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son Kullanma Tarihi:

Şarj Numarası: (Damga ile)

Ruhsat Tarih ve Numarası: 31.12.2007 /6224

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Pamuk kırmızıörmüceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	100 ml/da (Yumurta, larva, nimf)	
	İki noktalı kırmızıörmücek (<i>Tetranychus urticae</i>)	75 ml/da (Larva, nimf)	
Patlıcan	İki noktalı kırmızıörmücek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml/100 l su (Yumurta, larva, nimf)	1 gün
Elma	Avrupa kırmızıörmüceği (<i>Panonychus ulmi</i>)	50 ml/100 l su (Yumurta, larva, nimf)	7 gün
Bağ*	İki noktalı kırmızıörmücek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml/100 l su (Yumurta, larva, nimf)	7 gün
Domates (Sera)	İki noktalı kırmızıörmücek (<i>Tetranychus urticae</i>)	100 ml/100 l su (Yumurta, larva, nimf)	3 gün
Biber (Sera)	İki noktalı kırmızıörmücek (<i>Tetranychus urticae</i>)	100 ml/100 l su (Yumurta, larva, nimf)	3 gün
Hıyar (Sera)	İki noktalı kırmızıörmücek (<i>Tetranychus urticae</i>)	100 ml/100 l su (Yumurta, larva, nimf)	3 gün
Karpuz	İki noktalı kırmızıörmücek (<i>Tetranychus urticae</i>)	125 ml/da (Yumurta, larva, nimf)	3 gün
Kabak (Sera)	İki noktalı kırmızıörmücek (<i>Tetranychus urticae</i>)	100 ml/100 l su (Yumurta, larva, nimf)	3 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

TWISTER® 5 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grup	10A	Akarisit (Kırmızıörmücek İlacı)
------	-----	------------------------------------

50 g/l Hexythiazox

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR

ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE

HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN

TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA

KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI

KEŞİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE

BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ.

ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU

İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın.

Doktora başvurulmalıdır.

Cilt: Temas halinde elbiselerini çıkarın. Bitki koruma ürünü değen vücut

kisimlerini 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora

başvurulmalıdır.

Yutma: Yutulması halinde 1 bardak suya 1 çorba kaşığı tuz katılarak

hazırlanan tuzlu su içirilmek ya da parmakla boğazının gerisine

bastırılmak suretiyle hastayı kusturun. Tıbbi yardım sağlayın.

Soluma: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Derhal doktora

başvurulmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

®HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.'nin tescilli markasıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

Dr. Nesrin Z. K. K. K. K. K.

Daire Başkanı

Net Miktarı (kg veya lt)

Brüt ağırlık (kg)

Azami perakende satış fiyatı: Baskı

İÇİNDEKİLER:

Hexythiazox

Aromatik hidrokarbon

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H226 Alevlenir sıvı ve buhar

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H332 Solunması halinde zararlıdır.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden

uzak tutun. - Sigara içilmez.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz

koruyucu/üz koruyucu kullanın.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini

solumaktan kaçının.

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda

bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri

önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

30-03-2021
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Nesrin Z. K. K. K. K.
Bitki Koruma Ürün Müdürü
OSB Mr. 705

H. C.
REV.3

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta kırmızıörümceklere karşı mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı organizma yalnız tarla kenarında yada içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlara uygulama yapılmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz bölgesinde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise 10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılır.

Patlıcan, kabak (sera), hıyar (sera) ve karpuzda iki noktalı kırmızıörümceğe karşı yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızıörümcek bulunduğu mücadelede karar verilir.

Elmada Avrupa kırmızıörümceğine karşı mayıs ayından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılan sayımlarda 8-10 adet canlı birey/yaprak olduğunda uygulama yapılır.

Bağda iki noktalı kırmızıörümceğe karşı yapılan sayımlarda 5-8 adet canlı birey/yaprak olduğunda uygulama yapılır.

Domates (sera) ve biberde (sera) iki noktalı kırmızıörümceğe karşı yaprak başına ortalama 3 adet canlı kırmızıörümcek bulunduğu mücadelede karar verilir.

Meyve ağaçlarında genellikle çiçek taç yapraklarının tamamen dökülmesinden sonra birinci uygulama yapılmalı, yoğunluk olduğu takdirde tekrarlanmalıdır. Erginlerde etkisi düşük olduğundan ergin popülasyonu çalışmadan uygulamaya başlanmalıdır.

TWISTER® 5 EC doğrudan yumurtaların üzerine püskürtülürse yumurtalar açılmaz. Bitki koruma ürünü uygulanmış yaprağa bırakılan yumurtalar da açılmaz. Eğer erginler ürünle temas etmişlerse, bıraktıkları yumurtalar açılmaz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

TWISTER® 5 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 10A olarak sınıflandırılmış bir akarisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **TWISTER® 5 EC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 10 A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

TWISTER® 5 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grup	10A	Akarisit (Kırmızıörümcek ilacı)
------	-----	------------------------------------

50 g/l Hexythiazox

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürününü kendi ambalajında, kapalı, serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze OSB Mahallesi 700. Sk. No: 711/1
41400 Gebze / KOCAELİ
Tel: 0262 751 14 12
Fax: 0262 751 14 22



30 -03- 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Nevin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı



11.11

REV.3