İmal Tarihi :
Son kullanma tarihi. :
Şarj No :
Ruhsat tarih ve no.su :14-06-2004 / 4716

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu
Bağ	Bağ küllemesi (*Erysiphe necator*)	400 g/ 100 L su
	Bağ yaprak uyuzu (*Eriophyes vitis*)	490 g/ 100 L su
Elma	Külleme (*Podosphaera leucotricha*)	400 g/ 100 L su
Şeftali	Külleme (*Sphaerotheca pannosa var.pesicae*)	400 g/ 100 L su
Gül	Külleme (*Sphaerotheca pannosa var. rosae*)	400 g/ 100 L su
Begonya	Külleme (*Microsphaera begoniae*)	300-350 g/ 100 L su
Nohut	Antraknoz (*Ascochyta rabiei*)	300 g/ 100 L su
Soğan	Soğan mildiyösü (*Peronospora destructor*)	300 g/ 100 L su
Fasulye	Fasulye pası (*Uromyces phaseoli*)	300 g/ 100 L su
Hıyar	Kabakgillerde külleme (*Erysiphe cichoracearum*)	400 g/ 100 L su
Meyve ağaçları	Meyve ağacı akarları (*Tetranychus viennensis, T.urticae, Panonychus ulmi*)	400 g/ 100 L su
Turunçgiller	*Turunçgil kırmızıörümceği (*Panonychus citri*)	600 g/ 100 L su
	*Turunçgil tomurcukakarı (*Aceria sheldoni*)	600 g/ 100 L su

*** Kükürtlü ilaçlarla yazlık yağlar arasında 1 aylık süre olmalıdır.**

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Dr. Yunus TURAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

Takimsan

TAKİMSAN TARIM KİMYA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

FINESULFUR® 80 WG

Suda dağılabilir granül (WG)

Grup	M2	Fungisit-Akarisit (Mantar-Kırmızı Örümcek ilacı)

% 80 Kükürt

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbirşey yemeyiniz, içmeyiniz. Sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Büyük miktarlarda yutulduğunda mide bulantısı, kusma baş ağrısı, ishal ve uyku hali görülür.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:
Göz: Temas halinde 15–20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.
Cilt: Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15–20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurun.
Yutma: Zehir danışma merkezini arayın veya doktora başvurun. Bilinci kapalı hastaya ağızdan hiçbir şey vermeyin ve kusturmaya çalışmayın.
Soluma: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

® TAKİMSAN TARIM KİMYA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN TESCİLLİ MARKASIDIR.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

13 Nisan 2018
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Net Miktarı :
Brüt ağırlık :
Perakende satış fiatı :
(K.D.V. Dahil)

İÇİNDEKİLER:
Kükürt

ZARARLILIK İŞARETLERİ:

DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):
H315 Cilt tahrişine yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ (P):
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P264 Elleçlemeden sonra sabun ile iyice yıkayın.
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın
P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

TARIM KİMYA SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. TAKİMSAN
Mehmet TEKSOY
Yönetim Kurulu Üyesi

REV.0

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ Küllemesi:
1.ilaçlama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm uzunlukta iken ,
2.ilaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,
3.ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,
4.ve diğer ilaçlamalar: Üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Bağ yaprak uyuzu: Bağ küllemesi'ne karşı kullanılan ilaç bu zararlıyı da kontrol altına alındığından, bağ yaprak uyuzu'na karşı özel bir ilaçlama gerekmez.

Elma Küllemesi:
1. İlaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde ,
2. İlaçlama: Çiçek taç yapraklarının %60 –70'i döküldüğü dönemde,
3. ve diğer ilaçlamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak ilaçlamalara devam edilir.

Şeftali Küllemesi:
1.ilaçlama: Önceki yıllarda hastalığın yoğunluğuna göre belirlenmelidir. Hastalık, bahçede ilk defa çıkıyorsa belirtiler görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise budamadan sonra yapılacak kontrollerde, ağaçlardaki hastalık sürgün oranı 1/3'ü buluyorsa belirtiler görülmeden önce ilk ilaçlama yapılmalıdır.
2. ve diğer ilaçlamalar: Bitkinin gelişmesine, kullanılan preparatın etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar ilaçlamaya devam edilir.

Gül Küllemesi: Yaprak ve tomurcuk oluşumu başladığında ilk ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlama sabah serinliğinde, rüzgarsız ve yağışsız havalarda yapılmalı ve bitkinin tüm yüzeyi ilaçlanmalıdır. Kullanılan ilacın etki süresi ve hastalığın seyrine göre ilaçlamalar tekrarlanabilir.

Begonya Küllemesi: Yapraklar üzerinde ilk belirtiler görülünce başlanır. Birer hafta ara ile ilaçlama tekrarlanır.

Hıyar Kabakgillerde Külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27C'nin üstünde ve orantılı nemin de %50'nin altında olduğu zamanlarda ilaçlamaya ara verilmelidir.

Soğan mildiyö: Günlük ortalama sıcaklığın 16°C'ye ulaşması ve orantılı nemin en az %80'i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile ilaçlamalara başlanabilir.

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

T.C. İVRANDERE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13 Nisan 2018
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Takimsan

TAKİMSAN TARIM KİMYA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

FINESULFUR® 80 WG

Suda dağılabilir granül (WG)

Grup	M2	Fungisit-Akarisit (Mantar-Kırmızı Örümcek ilacı)

% 80 Kükürt

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Kabakgiller kükürte hassastır.
- Kayısı kükürte hassastır.
- Yağ tatbikatlarından en az 1 ay sonra tatbik edilmelidir.
- İlaç artıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çeşme yalaklarına bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİCİ FİRMA:
Atul Limited
Atul 396 020, Gujarat, Hindistan

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:
TAKİMSAN TARIM KİMYA SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Caddesi 700. Sokak No:711
Gebze 41480 – KOCAELİ
Tel : (0 262) 751 14 12
Fax : (0 262) 751 37 30

TAKİMSAN TARIM KİMYA SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Mehmet DELİSOY
Yönetim Kurulu Üyesi

REV.0

Nohut Antraknozu: İlaçlamaya günlük ortalama sıcaklığın 10°C ve orantılı nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa ilaçlama tekrarlanmalıdır.

Fasulye pası: Çevrede fasulye bitkilerinin yapraklarında pas püstüllerinin görülmesinden itibaren uygulamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilmelidir. Kuru fasulyede kapsüllerin olgunlaşma döneminde hastalık görüldüğünde ekonomik ürün kayıplarına neden olmadığından ilaçlamaya gerek yoktur.

Meyve ağacı akarları: Akdiken akarı, İkinoktalı kırmızıörümcek ve Avrupa kırmızıörümceği sayısının yaprak başına ortalama 8-10 adet bireyi geçmesi durumunda ilaçlamaya yapmak gerekir.

Turunçgil kırmızıörümceği: İlaçlamaya zararlının taze sürgünlere geçmeden önce yani çiçeklenmeden önceki devrede başlanmalıdır. Bu devre geçirilmiş ise meyve bağlandıktan bir hafta sonra da ilaçlama yapılabilir. Ağaçların içi ve dışı, yaprakların alt ve üst yüzeyleri iyice ilaçlanmalıdır. Günün en sıcak ve yapraklardaki çiğ dolayısıyla sabahın erken saatlerinde ilaçlama yapılmamalıdır.

Turunçgil tomurcukakarı: Zararlı ile bulaşık olduğu bilinen bahçelerde, iklim koşullarına göreğ ilkbaharda sürgünler 8-10 cm olduğu zaman eski gözlerden yeni gözlere geçişin en fazla olduğu Mart sonu Nisan başları ilaçlama yapılır. Birinci ilaçlamadan 20-25 gün sonra ilaçlama tekrarlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
Finesulfur 80 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M2 olarak sınıflandırılmış bir fungisit – akarisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Finesulfur 80 WG'nin** aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Yazlık ve kışlık yağlarla karıştırılmaz. İnsektisit ve fungisitlerle karışım yapılacaksa, karışımların bir ön karışım yapılarak denenmesinde yarar vardır.

TAKİMSAN TARIM KİMYA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

FINESULFUR® 80 WG

Suda dağılabilir granül (WG)

Grup	M2	Fungisit-Akarisit (Mantar-Kırmızı Örümcek ilacı)

% 80 Kükürt

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

13 Nisan 2018
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ... GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
... EDİLMİŞTİR

TARIM KİMYA SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. TAKİMSAN
Mehmet TEKSOY
Yönetim Kurulu Üyesi