

İmal Tarihi : (Başlı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi. (")

Şarj No. (Damga ile)

Ruhsat tarih ve no su

Tarım ve Köyleri Bakanlığının tarih ve Sayılı Ziraat Mücadele İlaç Ruhsatını haizdir.

KULLANIM ALANI

ZOEKON tohumla çoğalan geniş yapraklı yabancıotlar karşı şekerpancar ekili alanlarında kullanılan bir yabancıot ilacıdır.

ETİKET ADI Kullanma Dozu ve Dönemi

ŞEKERPANCARI

450-600 ml/ha

Dağık dolu hafif topraklar için, yığsık dolu orta ve ağır topraklar için önerir. (Ekim öncesi ve çıkış öncesi)

KONTROL ETTİĞİ YABANCIOTLAR

Kırmızı kök (Bü kuyruğu) (Amaranthus retroflexus), Amaranthus bilside, *Morol. ibşg.*
Yabani hardal (Sinapsi anvenisi)
Haski papatyası (Matricaria chamomilla)
Çoban pantası (Capsella bursa-pastoris)
Tatlı köpek papatyası (Anthemis anvenisi)
Köpek otu (Zizanius nigrum)
Balıbalıba (Lamium amplexicaule)
Yabani tıpa (Raphanus raphanistrum)
Kuş otu (Dianthus medis)
Fare kuyruğu (Aragatis anvenisi)
Gelenik (Papaver rhoeas)
Targan otu (Lysichiton)
Çoban değneği (Polygonum aviculare)

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

İlaçlama alanının deposu yan yarıya su ile doldurulur. Genel miktar laç bir miktar su ile karıştırılarak depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluysa kadar su ilave edilir. Depoya konacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılarak aletin litre bir dekara ne kadar su harcayacağı hesaplanmıştır.

KULLANMA ZAMANI VE ŞEKLİ:

1. Şekerpancar ekiminden önce (ekim öncesi): Pancar ekimi için hazırlanmış kereviz ve düzün toprak yüzeyine laç, önerilen dozda uygulanır. Daha sonra kumlu kumürer veya tırmıkla toprağın 3-4 cm derinliğine karıştırıldıktan sonra pancar ekimine geçilir. Kurak bölgeler için laçın daha iyi ekili etmesi yönünden es uygun uygulama yöntemidir.

2. Çıkış öncesi uygulama: Şekerpancar ekiminden sonra pancar ve yabancıotların toprak yüzeyine çıkıpından 3-4 gün önceye kadar yapılan uygulamadır. Pancar ekimi sonrasında yağışların yeterli ve düzenli olarak dağıldığı bölgeler için uygundur. Yağın yeterli olmadığı bölgelerde ilaçlamadan sonra mutlaka yağmurlama sulama yapılmalıdır.

KARŞILABİLİRLİK DURUMU:

Merhacior ve tritiale grubu ilaçlara karşıtlıkla kullanılabılır.

TARIM VE KÖYLERİ BAKANLIĞI
KOBİTİM VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Ahmet H. S. S. S.
Genel Müdür

ETİKET/REV.0



ZOEKON

HERBİSİT (Yabancıot İlaç)
Suspansiyon Konsantre

Etikeli Madde: Litrede 430 gr Chloridazon
5-amino-4-chloro-2-phenyl-3(2H) pyridazinon
Şaşırtılarda akut ajızdan LD₅₀ = +2140 mg/kg

DİKKAT

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ.

İLAÇ BÜHARINI VE ZERRERLERİNİ TENEFÜS ETMEYİNİZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDIVAN, GÖZLÜK KULLANINIZ.

İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEMİNİZ.

SIGARA İÇMEYİNİZ.

DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.

İLAÇLI SAHAHA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :

Göz, deri ve solunum sisteminde tahriş olabilir. Baş ağrısı, baş dönmesi ve halsizlik olabilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Zehirlenme halinde doktor çağırınız ve ilacın etkilerini gösteriniz. İlaçla temas eden vücud kuzumlarını bir sabunlu suyla yıkayınız. İlaç elbiseleri deşeyiniz. Göze sıçraması bil suyla yıkayınız.

ANTİDOTU:

Bilinen bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanır.

UZEM (Ulusal Zehir Merkezi) Tel: 114

Net Miktar (kg veya lt)

Brüt ağırlık (kg)

Azami perakende satış fiyatı: Başlı

T. B. Yazısının Tarih ve No su:

Başlı gerit (imal tarihi ve şarj no su ile birlikte)

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT

EDİLEBİLİR HUSUSLAR

- Yabancıotlara köklerinden nüfus edenek, onları pürtenken veya giymekten sonra 05/05/07

- Ekli elbiseleri için yağışla ıhıyık vardır. İlaçlamadan sonraki 2-3 hafta içinde 20-25 mm yağın yağmaması gerekir.

- Uygun koşullarda ekim 4-6 hafta devam eder.

- Çoğulmik madde miktarı %25 oranında fazla olursa, fazla kum ve çöğün topraklarda kullanılması tavsiye edilmez.

- Deklara 40-50 lt suyla, çıkış basıncı aletlerle uygulanır.

- İlaçla tarlayı herhang bir nedenle bırakmak gerekirse, soğan şekerpancar, patates veya mısır ekilebilir. Bunları dönüp çözümlük alanına, havuç, hiyer, fıkulye ve domates ekilmemelidir.

Tarla sürülmeden sonra sorbentlerle hıfuzatı edilebilir.

- Çoğulmik hafif topraklarda, fazla gübreleme yapılmaz. Çiğık gübreleme sorbentlerde verim.

- Baklılara zehirli.

- Su kaynaklarına bulaşmaktan kaçınılmalıdır.

- Arılara zehirlidir.

- Boş laç kutularının suşüne uygun olarak imha edilir.

DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fizikal, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınıftan dışarda bir değışiklik olmaz.

FİRMA BEYANI: Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilacının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilacının hatalı depolanması veya tahribi için sorumlu tutulmayacak şekilde etkisizden önce otlaç zarar için sorumluluk kabul etmezler.

İMALATÇI FİRMA:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi

İsınan Dede Cad. 793. Sokak

41480 Gebze/Kocaeli

Tel : (0262) 751 14 12 (7 hat)

Fax : (0262) 751 14 22

