



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK

Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad.
700. Sokak 41480 Gebze / KOCAELİ
Tel : 0(262) 751 14 12 (Pbx)
Faks : 0(262) 751 37 35
E-mail : info@hektas.com.tr - http://www.hektas.com.tr

EC FERTİLİZER

SUPA BOR

BORON ETANOL AMİN

21-04-2017



GARANTİ EDİLEN İÇERİK:

Mikro Besin Maddeleri	(% w / w)
Suda çözünür Bor (B).....	8

ÇOCUKLARDAN, HAYVANLARDAN, YİYECEKLERDEN UZAK TUTUNUZ.
UYGULAMADAN SONRA VE YEMEKLERDEN ÖNCE ALLERİNİZİ YIKAYINIZ.
KURU BİR YERDE SIKICA KAPALI ORJİNAL KUTUSUNDA SAKLAYINIZ.
GÜNEŞTEN KORUYUNUZ.
TOPRAK VE/VEYA YAPRAK ANALİZİ YAPTIRILARAK GÜBRE KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR.

İTHALATÇI FİRMA: HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede cad. 700.
Sok. 41480 GEBZE/ KOCAELİ
Tel : + 90-262-751 14 12 (Pbx)
Fax: + 90-262-751 14 22

ÜRETİCİ FİRMA:

Agrichem
2 Hovey Road, Yatala QLD 4207 AUSTRALIA

Net ağırlığı: 1.200 Kg (1 Lt)

Üretim Tarihi (Prod. Date) :
Son kullanma tarihi (Expiry date) :
Şarj numarası (Batch number) :

Tescil No : 5857
Lisans No : 086

KULLANILMASI: (Dozu, sayısı ve zamanı) Tüm ürünlerde genel olarak uygulanacak doz dekara veya 100 lt suya 100 ml – 300 ml'dir. Kullanmadan önce ambalajı iyice çalkalayınız. 2/3' ü su dolu tanka önerilen dozda Supa Bor boşaltılır, eksik su ilave edilir, karıştırılır. Ön deneme yapılarak karışım yapılabilir. Birçok tarım ilacı ile karışabilir.

(Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız ve asla uygun doz oranlarını aşmayınız.)

Sert Çekirdekliiler (Şeftali, Kiraz, Kayısı, Erik vs) : Dekara 100-200 ml dozda, çiçeklenme öncesi gözler uyanırken ve pembe göz döneminde ayrıca hasat sonrasında yapraklar dökülmeden kullanılır.

Yumuşak Çekirdekliiler (Elma, Armut, Ayva): Dekara 100-200 ml dozda, gözler patladığında ve taç yapraklar dökülünce ve hasat sonrası yapraklar dökülmeden kullanılır. Çiçeklenme dönemi kullanılmaz.

Lahana, Brüksel Lahanası, Karnabahar, Brokoli: Dekara 300 ml dozda, bitkilerin 4-6 yapraklı döneminde kullanılır. Gerekirse 10-14 gün arayla tekrarlanır.

Havuç: Dekara 200-300 ml dozda, bitkiler 10-15 cm boya erişince kullanılır. Gerekirse 10-14 gün arayla tekrarlanır. Düşük doz hafif, yüksek doz ağır topraklarda uygulanır.

Şekerpancarı, Şalgam: Dekara 300 ml dozda, bitkilerin 4-6 yapraklı döneminde kullanılır. Gerekirse 10-14 gün arayla tekrarlanır.

Bezelye, Soya, Baklagiller: Dekara 200 ml dozda, bitkiler 10-15 cm boya erişince kullanılır. Gerekirse 10-14 gün arayla tekrarlanır.

Fasulye: Dekara 200 ml dozda, bitkiler 10-15 cm boya erişince kullanılır.

Kanola: Dekara 300 ml dozda, gövde genişlemeye başlarken kullanılır.

Çilek: Dekara 100 ml dozda, beyaz göz döneminde kullanılır.





HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK

Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad.
700. Sokak 41480 Gebze / KOCAELİ
Tel : 0(262) 751 14 12 (Pbx)
Faks : 0(262) 751 37 35
E-mail : info@hektas.com.tr - http://www.hektas.com.tr

Ayçiçeği: Dekara 200-300 ml dozda kullanılır. Bu bitki için önemi büyüktür. İki çift yapraklı dönemi ile çiçek gözü dönemi arasında kalan devrede uygulanır. Gerekirse bu devre içinde 10-14 gün ara ile tekrarlanabilir.

Bağ: Dekara 100 ml dozda, yapraklar çıktıktan sonra çiçek demetleri belirlediğinde ve dane tutumunda olmak üzere 2 kez uygulanır.

Mısır: Dekara 200 ml dozda, bitkilerin 3-6 yapraklı döneminde uygulanır. Gerekirse 10-14 gün sonra aynı dozda tekrarlanır.

Domates: Dekara 100-200 ml dozda, bitkilerin 4-6 yapraklı döneminde uygulanır. Gerekirse 10 gün ara ile tekrarlanır. Düşük doz yapraktan, yüksek doz damlamadan verilir.

Patates: Dekara 100-200 ml dozda, ilk uygulama %100 çıkıştan 1 hafta sonra, 2. uygulama 10-14 gün sonra, 3. uygulama ise yumru teşekkülü esnasında 100 ml/da dozunda yapılır.

Soğan: Dekara 100 ml dozda, püskürtmeye elverişli yeterli yaprak yüzeyi oluştuğunda kullanılır. 10-14 gün sonra gerekirse tekrarlanır.

Narenciye: Dekara 200-300 ml veya 100 lt suya 200 ml dozunda, beyaz göz döneminde veya beyaz gözler ayrıldığında uygulanır.

Zeytin: Dekara 200- 300 ml dozda, çiçeklenme öncesinde uygulanan ilk ilaçlamada önerilen dozda ilaca karıştırılarak, yapraklara püskürtülür. Çiçeklenme sonrası bir uygulama yapılmalıdır.

Çeltik: Dekara 100 ml dozda, kardeşlenme başladığında kullanılır.

Marul, Kıvırcık Salata: Dekara 100 ml dozda, çıkıştan veya şaşırtmadan 10-15 gün sonra uygulanır.

Serada kullanım: Dekara 200 ml dozda kullanılır. Uygulama zamanı için yukarıda belirtilen genel tavsiyelere uyulur.

Pamuk: Dekara 100 ml dozda, çiçeklenmeden hemen önce uygulanır. Gerek görülürse aynı doz koza oluşumundan sonra tekrarlanır.

Muz: Dekara 200 ml dozda, çiçeklenmeden hasata kadar 3 haftalık aralıklarla uygulanır.

Tütün: Dekara 100 ml dozda, tarla dönemi başlangıcından itibaren 15 gün arayla 2 kere uygulanır.

Fındık: 100 lt suya 100 ml dozda, Mart ve Haziran ayları arasında kullanılır.

DEPOLAMA DURUMU: Kuru bir yerde, kapalı ambalajında ve -10 - + 40 °C arasındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden, su kaynaklarından uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerlerde ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalıdır ve iyi bir havalanma sağlanmalıdır. Güneş ışığı ile direk temas ettirmeyiniz.

FİRMA BEYANI: Kurak, yüksek nem, don, yağmur gibi koşullarda uygulamadan kaçınınız. Ürünün ambalajında verilmiş olan bilgiler analizi ile sınırlı olup, kullanımları ise kontrolümüz dışındadır. Bu sebepten dolayı satıcı, kullanımdan veya depolanmasından doğan herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Bu mamül üreticisinin etiketinde belirttiği şekilde kullanılmalıdır. Bunun dışında yapılacak uygulamaların riski kullanıcıya aittir.

TAŞIMA TALİMATI: Elle taşıma esnasında eldiven giyiniz. Deri ve göz temasından kaçınınız. Gübre ile temas eden vücut kısımlarını bol su ile yıkayınız.

- ✓ Piyasaya süreceğimiz ürünün üzerindeki etiket bilgilerinin aynısı olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tesbiti halinde, 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyoruz.

